

រៀបរៀងដោយ លីម ផល្គុន

បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណិតវិទ្យា

◆◆◆◆◆◆◆◆◆

គណិតវិទ្យា

គ្រឿងប្រឡងអាហាររូបករណ៍

ឧបធាន ៖

- វិញ្ញាសាជ្រើសពិសេស
- ដំណោះស្រាយក្បោះក្បាយ
- សង្ខេបមេរៀន និង ល្បិចដោះស្រាយ

ភាគ១

$$\sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(x).dx = \int_{a_1}^{a_{n+1}} f(x).dx$$

ក្បួនដង្ហក្របយ៉ាង

គណិតវិទ្យា

សម្រាប់គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

កេរ្តិ៍សិទ្ធិ ដោយ លីម ផល្គុន

Tel: 017 768 246

www.mathtoday.wordpress.com

គណៈកម្មការនីតិវិធី និង រៀបរៀង

លីម ផល្គុន និង អ៊ុន សំណាង

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស

**លោក យ៉ង់ ធារី
លោក លីម សុន
លោក សែន ពិសិដ្ឋ**

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ

លោក លីម មិត្តសិរ

ការិយាល័យទូរ

លោក អ៊ុន សំណាង

អេឡិចត្រូនិក

សូមស្វាគមន៍អ្នកសិក្សាជាទីស្រឡាញ់រាប់អាន !

សៀវភៅ គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសដែលលោកអ្នកកំពុងតែកាន់អាននេះ ខ្ញុំបាទបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ទុកជាឯកសារសម្រាប់អ្នកសិក្សាដែលមាន បំណងត្រៀមប្រឡងយកអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេស និង សម្រាប់ ត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍ចូលគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាក្នុងប្រទេស។ យើងខ្ញុំបានជ្រើសរើសលំហាត់ពិសេសៗមកធ្វើដំណោះស្រាយ យ៉ាងពិស្តារ ព្រមទាំងមានលំហាត់អនុវត្តសម្រាប់អ្នកសិក្សាហ្វឹកហាត់ដោះស្រាយដោយ ខ្លួនឯង។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះ នឹងអាចចូលរួមផ្តល់នូវ គំនិត និង វិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាកំរិត អាហារូបករណ៍ ចំពោះលោកអ្នកសិក្សាជាពុំខានឡើយ ។

ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរចំពោះលោកអ្នក សូមមានសុខភាពល្អ មានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងគ្រប់ភារកិច្ច ។

បាត់ដំបងថ្ងៃទី១០ឧសភា ឆ្នាំ២០១២

អ្នកនិពន្ធ និង ស្រាវជ្រាវ

លឹម ផល្គុន

Tel :017 768 246

Email: lim_phalkun@ymail.com

Website: www.mathtoday.wordpress.com

វិញ្ញាសាទី០១

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេមានសមីការ $z^3 - (4 + 3i)z^2 + 2(1 + 5i)z + 4(1 - 2i) = 0$

ក/កំណត់ចំនួនពិត α ដើម្បីឲ្យ $z = \alpha$ ជាឫសមួយរបស់ (E) ។

ខ/ចូរសរសេរសមីការ (E) ជា $(z - \alpha)(z^2 + pz + q) = 0$

ដែល p និង q ជាចំនួនកុំផ្លិចត្រូវកំណត់ ។

គ/ដោះស្រាយសមីការ (E) ក្នុងសំណុំកុំផ្លិច ។

II-គេមានអនុគមន៍ $f(n) = \frac{an^2 + bn + c}{2^n}$ ដែល $n \in \mathbb{N}$

ក/កំណត់បីចំនួនពិត a, b, c ដើម្បីឲ្យបាន

$$f(n+1) - f(n) = \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } n \in \mathbb{N} \quad \text{។}$$

ខ/ទាញរកផលបូក $S_n = \frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2^2} + \frac{3^2}{2^3} + \dots + \frac{n^2}{2^n}$

រួចគណនាលីមីតនៃ S_n កាលណា $n \rightarrow +\infty$ ។

III-គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{x^3 + 1}} \cdot dx$

IV-គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): $xy' + 3y = 4x + 9$

ក/កំណត់ពីរចំនួនពិត α និង β ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍ $y_1 = \alpha x + \beta$

ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ (E) ។

ខ/រកចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E) ។

ជំនួសសមីការ

I-គេមានសមីការ $z^3 - (4 + 3i)z^2 + 2(1 + 5i)z + 4(1 - 2i) = 0$

ក/កំណត់ចំនួនពិត α ៖

ដើម្បីឲ្យ $z = \alpha$ ជាឫសមួយរបស់(E) លុះត្រាតែវាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

គេបាន $\alpha^3 - (4 + 3i)\alpha^2 + 2(1 + 5i)\alpha + 4(1 - 2i) = 0$

$$(\alpha^3 - 4\alpha^2 + 2\alpha + 4) + i(-3\alpha^2 + 10\alpha - 8) = 0$$

គេទាញ
$$\begin{cases} \alpha^3 - 4\alpha^2 + 2\alpha + 4 = 0 \\ -3\alpha^2 + 10\alpha - 8 = 0 \end{cases}$$

$$\text{សមមូល } \begin{cases} (\alpha - 2)(\alpha^2 - 2\alpha - 2) = 0 \\ (\alpha - 2)(-3\alpha + 4) = 0 \end{cases}$$

គេទាញបាន $\alpha = 2$ ជាឫសតែមួយគត់របស់ប្រពន្ធសមីការខាងលើ

ដូចនេះ $\alpha = 2$ ជាចំនួនពិតដែលត្រូវរក ។

ខ/សរសេរសមីការ(E)ជាពង $(z - \alpha)(z^2 + pz + q) = 0$

សមីការ $(z - \alpha)(z^2 + pz + q) = 0$ អាចសរសេរជា ៖

$$z^3 + (p - \alpha)z^2 + (q - \alpha p)z - \alpha q = 0 \quad (1)$$

$$\text{ដោយ } z^3 - (4 + 3i)z^2 + 2(1 + 5i)z + 4(1 - 2i) = 0 \quad (2)$$

ធ្វើការប្រៀបធៀបសមីការ(1) និង (2) គេទាញបាន ៖

$$\begin{cases} p - \alpha = -4 - 3i \\ q - \alpha p = 2 + 10i \\ -\alpha q = 4 - 8i \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} p - 2 = -4 - 3i \\ q - 2p = 2 + 10i \\ -2q = 4 - 8i \end{cases} \quad (\text{ព្រោះ } \alpha = 2)$$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបាន $p = -2 - 3i$; $q = -2 + 4i$

$$\text{ដូចនេះ (E): } (z - 2)[z^2 - (2 + 3i)z - 2 + 4i] = 0 \quad ។$$

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គ/ដោះស្រាយសមីការ (E) ក្នុងសំណុំកុំផ្លិច ៖

$$\text{គេមាន (E): } (z - 2)[z^2 - (2 + 3i)z - 2 + 4i] = 0$$

$$\text{គេទាញ } z - 2 = 0 \quad \text{នាំឲ្យ } z = 2$$

$$\text{ហើយ } z^2 - (2 + 3i)z - 2 + 4i = 0$$

$$\Delta = (2 + 3i)^2 - 4(-2 + 4i) = 3 - 4i = (2 - i)^2$$

$$\text{គេទាញបូស } \begin{cases} z_1 = \frac{2 + 3i - 2 + i}{2} = 2i \\ z_2 = \frac{2 + 3i + 2 - i}{2} = 2 + i \end{cases}$$

ដូចនេះសំណុំបូសសមីការ $z \in \{2, 2i, 2 + i\}$ ។

$$\text{II-គេមានអនុគមន៍ } f(n) = \frac{an^2 + bn + c}{2^n} \quad \text{ដែល } n \in \mathbb{N}$$

ក/កំណត់បីចំនួនពិត a, b, c ៖

$$f(n+1) - f(n) = \frac{n^2}{2^n} \quad (1)$$

$$\text{មាន } f(n+1) = \frac{a(n+1)^2 + b(n+1) + c}{2^{n+1}} = \frac{an^2 + (2a+b)n + a+b+c}{2^{n+1}}$$

គណិតវិទ្យាអេហារូបករណ៍

$$\text{គេបាន } f(n+1) - f(n) = \frac{-an^2 + (2a-b)n + a+b-c}{2^{n+1}} \quad (2)$$

ដោយប្រៀបធៀបសមីការ (1) និង (2) គេបាន ៖

$$\begin{cases} -a = 2 \\ 2a - b = 0 \\ a + b - c = 0 \end{cases} \quad \text{នាំឲ្យ} \quad \begin{cases} a = -2 \\ b = -4 \\ c = -6 \end{cases} \quad \text{។ ដូច្នេះ: } a = -2, b = -4, c = -6$$

$$\text{ខ/ទាញរកផលបូក } S_n = \frac{1^2}{2} + \frac{2^2}{2^2} + \frac{3^2}{2^3} + \dots + \frac{n^2}{2^n}$$

$$\text{ចំពោះ: } a = -2, b = -4, c = -6 \quad \text{គេបាន } f(n) = -\frac{2n^2 + 4n + 6}{2^n}$$

$$\text{និង } f(n+1) - f(n) = \frac{n^2}{2^n} \quad (\text{តាមសម្រាយខាងលើ}) \quad \text{។}$$

$$\text{គេបាន } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2^k} = \sum_{k=1}^n [f(k+1) - f(k)] = f(n+1) - f(1)$$

$$\text{តែ } f(1) = -\frac{2+4+6}{2} = -6 \quad \text{និង } f(n+1) = -\frac{n^2 + 4n + 6}{2^n}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } S_n = 6 - \frac{n^2 + 4n + 6}{2^n} \quad \text{និង } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 6 \quad \text{។}$$

III-គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_0^1 \sqrt{\frac{x}{x^3+1}} \cdot dx$

គេអាចសរសេរ $I = \int_0^1 \frac{x^{\frac{1}{2}} \cdot dx}{\sqrt{x^3+1}}$ តាង $t = x^{\frac{3}{2}}$ នោះ $dt = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} \cdot dx$

បើ $x = 0$ នោះ $t = 0$ និង $x = 1$ នោះ $t = 1$ ។

គេបាន $I = \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}$ តាង $t = \tan \varphi$ នោះ $dt = (1 + \tan^2 \varphi) d\varphi$

បើ $t = 0$ នោះ $\varphi = 0$ និង $t = 1$ នោះ $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ។

គេបាន $I = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1 + \tan^2 \varphi) d\varphi}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}} = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d\varphi}{\cos \varphi} = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos \varphi \cdot d\varphi}{1 - \sin^2 \varphi}$

តាង $u = \sin \varphi$ នោះ $du = \cos \varphi \cdot d\varphi$

បើ $\varphi = 0$ នោះ $u = 0$ និង $\varphi = \frac{\pi}{4}$ នោះ $u = \frac{1}{\sqrt{2}}$

គេបាន $I = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{du}{1-u^2} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} \right) du$

$$I = \frac{1}{3} \left[-\ln|1-u| + \ln|1+u| \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right)$$

ដោយ $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = (\sqrt{2}+1)^2$ នោះ $I = \frac{1}{3} \ln(\sqrt{2}+1)^2$

ដូចនេះ $I = \frac{2}{3} \ln(\sqrt{2}+1)$ ។

IV-គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E): $xy' + 3y = 4x + 9$

ក/កំណត់ពីរចំនួនពិត α និង β

ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍ $y_1 = \alpha x + \beta$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ (E)

លុះត្រាតែវាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (E) ។

គេបាន $xy'_1 + 3y_1 = 4x + 9$ (1)

ដោយ $y_1 = \alpha x + \beta$ នោះ $y'_1 = \alpha$ ។

សមីការ (1) អាចសរសេរ ៖

$$\alpha x + 3(\alpha x + \beta) = 4x + 9$$

$$4\alpha x + 3\beta = 4x + 9$$

គេទាញ $\alpha = 1$; $\beta = 3$ ។

ឧ/រកចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E)

$$\text{គេមាន } xy'_1 + 3y_1 = 4x + 9 \quad (1)$$

$$xy' + 3y = 4x + 9 \quad (2)$$

ដកសមីការ (2) និង (1) អង្គនិងអង្គគេបាន ៖

$$x(y' - y'_1) + 3(y - y_1) = 0 \quad (3)$$

$$\text{តាង } u = y - y_1 \text{ នៅ: } u' = y' - y'_1$$

$$\text{តាមសមីការ (3) គេបាន } xu' + 3u = 0 \text{ នាំឲ្យ } \frac{u'}{u} = -\frac{3}{x}$$

$$\text{ឬ } (\ln u)' = -\frac{3}{x} \text{ នាំឲ្យ } \ln u = -\int \frac{3}{x} dx = -3 \ln |x| + c_1$$

$$\text{គេទាញ } u = e^{-3 \ln |x| + c_1} = \frac{1}{|x|^3} \cdot e^{c_1} = \frac{k}{x^3}; k \in \mathbb{R}$$

$$\text{ដោយ } u = y - y_1 \text{ នៅ: } y = u + y_1 = \frac{k}{x^3} + x + 3$$

$$\text{ដូចនេះ: } y = x + 3 + \frac{k}{x^3}, k \in \mathbb{R} \text{ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ(E) ។}$$

វិញ្ញាសាទី០២

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេឲ្យអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^a \sqrt{\frac{x}{x^n + a^n}} \cdot dx$ ដែល $a > 0$ ។

ក/កំណត់តម្លៃ n ដើម្បីឲ្យ I_n មានតម្លៃមិនអាស្រ័យនឹង a ។

ខ/គណនា I_n ចំពោះតម្លៃ n ដែលបានរកឃើញខាងលើ ។

II-គេឲ្យសមីការដឺក្រេទីបី (E) : $z^3 - (3 + 4i)z^2 - (1 - 6i)z + 3 - 2i = 0$

ក/កំណត់ចំនួនពិត b ដើម្បីឲ្យ $z = ib$ ជាឫសមួយរបស់(E) ។

ខ/បង្ហាញថាសមីការ (E) មានឫសមួយជាចំនួនពិត ហើយឫសពីរទៀតជាចំនួនកុំផ្លិចរួចរកឫសទាំងនោះ ។

គ/ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចប្រកបដោយតម្រុយអវត្ថុណាម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j})$

គេមានបីចំនុច A,B,C មានអាហ្វិក z_1, z_2, z_3 ជាឫសនៃ (E) ។

ចូរដៅចំនុច A,B,C រួចរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

III-គេមានស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (u_n) កំណត់ដោយ ៖

$$u_1 = -1 \quad \text{និង} \quad u_{n+1} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} u_n + \frac{\sqrt{n+1}}{2^n} \quad \text{គ្រប់ } n \in \mathbb{N} \text{ ។}$$

ក/រកប្រភេទនៃស្វ៊ីត $v_n = \frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1}} - \frac{u_n}{\sqrt{n}}$ រួចគណនា $S_n = \sum_{k=1}^n v_k$ ។

ខ/ទាញរកតួទូទៅ u_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

IV-គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ៖

$$(E): x^2 y'' + (4x - 2x^2) y' + 2(x - 1)^2 y = 0$$

$$(F): y'' - 2y' + 2y = 0$$

ក/ចូរបង្ហាញថាបើ $y = x^2 f(x)$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (F)

នោះអនុគមន៍ f ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

ខ/ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

ដំណោះស្រាយ

I-ក/កំណត់តម្លៃ n ដើម្បីឲ្យ I_n មានតម្លៃមិនអាស្រ័យនឹង a

$$\text{គេមាន } I_n = \int_0^a \sqrt{\frac{x}{x^n + a^n}} \cdot dx \quad \text{ដែល } a > 0$$

$$\text{តាង } x = at \quad \text{នោះ } dx = a \cdot dt$$

$$\text{បើ } x = 0 \text{ នោះ } t = 0 \quad \text{ហើយ } x = a \text{ នោះ } t = 1$$

$$\text{គេបាន } I_n = \int_0^1 \sqrt{\frac{at}{a^n t^n + a^n}} a \cdot dt = (a)^{\frac{3-n}{2}} \int_0^1 \frac{t^{\frac{1}{2}} dt}{\sqrt{t^3 + 1}}$$

$$\text{ដើម្បីឲ្យ } I_n \text{ មានតម្លៃមិនអាស្រ័យនឹង } a \text{ លុះត្រាតែ } \frac{3-n}{2} = 0$$

$$\text{គេទាញបាន } n = 3 \quad \text{។}$$

ខ/គណនា I_n ចំពោះតម្លៃ n ដែលបានរកឃើញខាងលើ

$$\text{បើ } n = 3 \text{ គេបាន } I_3 = \int_0^1 \frac{t^{\frac{1}{2}} dt}{\sqrt{t^3 + 1}} \quad \text{តាង } u = t^{\frac{3}{2}} \text{ នោះ } du = \frac{3}{2} t^{\frac{1}{2}} \cdot dt$$

$$\text{បើ } t = 0 \text{ នោះ } u = 0 \text{ និង } t = 1 \text{ នោះ } u = 1 \quad \text{។}$$

$$\text{គេបាន } I_3 = \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{du}{\sqrt{u^2 + 1}} = \frac{2}{3} \left[\ln |u + \sqrt{u^2 + 1}| \right]_0^1 = \frac{2}{3} \ln(1 + \sqrt{2})$$

$$\text{ដូចនេះ: } I_3 = \frac{2}{3} \ln(1 + \sqrt{2}) \quad \text{។}$$

II-គេឲ្យសមីការដឺក្រេទីបី (E): $z^3 - (3 + 4i)z^2 - (1 - 6i)z + 3 - 2i = 0$

ក/កំណត់ចំនួនពិត b

ដើម្បីឲ្យ $z = ib$ ជាឬសមួយរបស់ (E) លុះត្រាតែវាផ្ទៀងផ្ទាត់ (E)

$$\text{គេបាន } i^3 b^3 - (3 + 4i)i^2 b^2 - (1 - 6i)ib + 3 - 2i = 0$$

$$-ib^3 + 3b^2 + 4ib^2 - ib - 6b + 3 - 2i = 0$$

$$(3b^2 - 6b + 3) + i(-b^3 + 4b^2 - b - 2) = 0$$

$$\text{គេទាញ } \begin{cases} 3b^2 - 6b + 3 = 0 & (1) \\ -b^3 + 4b^2 - b - 2 = 0 & (2) \end{cases}$$

តាម (1) គេបាន $3(b - 1)^2 = 0$ នាំឲ្យ $b = 1$ ។

យក $b = 1$ ជួសក្នុង (2) គេបាន $-1 + 4 - 1 - 2 = 0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់។

$$\text{ដូចនេះ: } b = 1 \quad \text{។}$$

ខ/បង្ហាញថាសមីការ (E) មានឫសមួយជាចំនួនពិត ៖

តាង $z = a$ ជាឫសពិតរបស់សមីការ (E) គេបាន ៖

$$a^3 - (3 + 4i)a^2 - (1 - 6i)a + 3 - 2i = 0$$

$$a^3 - 3a^2 - 4ia^2 - a + 6ia + 3 - 2i = 0$$

$$(a^3 - 3a^2 - a + 3) + i(-4a^2 + 6a - 2) = 0$$

$$\text{គេទាញបាន } \begin{cases} a^3 - 3a^2 - a + 3 = 0 \\ -4a^2 + 6a - 2 = 0 \end{cases} \quad \text{ឬ} \quad \begin{cases} (a - 3)(a - 1)(a + 1) = 0 \\ (a - 1)(-4a + 2) = 0 \end{cases}$$

ប្រពន្ធសមីការមានឫសតែមួយគត់គឺ $a = 1$ ។

ដោះស្រាយសមីការ (E) :


តាមសម្រាយខាងលើគេទាញបាន $z_1 = i$; $z_2 = 1$ ជាឫសនៃ (E)

តាមទ្រឹស្តីបទផ្សេក $z_1 + z_2 + z_3 = 3 + 4i$

$$\text{គេទាញ } z_3 = 3 + 4i - i - 1 = 2 + 3i \quad \text{។}$$

ដូចនេះ $z_1 = i$; $z_2 = 1$, $z_3 = 2 + 3i$ ។

គ/ ដោយចំណុច A, B, C រួចរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC



គេមាន $A(1); B(i) ; C(3 + 2i)$

អាហ្វិកនៃ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ គឺ $z_B - z_A = -1 + i$ និង $z_C - z_A = 2 + 2i$

$$\text{គេមាន } \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2 + 2i}{-1 + i} = -2i \text{ នាំឲ្យ } \text{Arg}\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}$$

នាំឲ្យ $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ ។ ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

III-ក/រកប្រភេទនៃស្វ៊ីត $v_n = \frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1}} - \frac{u_n}{\sqrt{n}}$

មាន $u_1 = -1$ និង $u_{n+1} = \sqrt{1 + \frac{1}{n}} u_n + \frac{\sqrt{n+1}}{2^n}$ គ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

គេបាន $u_{n+1} = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} u_n + \frac{\sqrt{n+1}}{2^n} = \sqrt{n+1} \left(\frac{u_n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2^n} \right)$

នាំឲ្យ $\frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1}} - \frac{u_n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2^n}$ ឬ $v_n = \frac{1}{2^n}$

គេបាន $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$ ថេរ

ដូចនេះ (v_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានរេសុង $q = \frac{1}{2}$ ។

គណនា $S_n = \sum_{k=1}^n v_k$

គេបាន $S_n = v_1 \times \frac{1-q^n}{1-q}$ តែ $v_1 = \frac{u_2}{\sqrt{2}} - u_1$

និង $u_2 = \sqrt{2}u_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ នោះ $v_1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$

$$\text{គេបាន } S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

$$\text{ដូចនេះ } S_n = 1 - \frac{1}{2^n} \quad \text{។}$$

ខ/ទាញរកតួទូទៅ u_n ជាអនុគមន៍នៃ n

$$\text{គេមាន } v_n = \frac{u_{n+1}}{\sqrt{n+1}} - \frac{u_n}{\sqrt{n}}$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} v_k = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{u_{k+1}}{\sqrt{k+1}} - \frac{u_k}{\sqrt{k}} \right)$$

$$S_{n-1} = \frac{u_n}{\sqrt{n}} - u_1$$

$$\text{គេទាញ } u_n = \sqrt{n}(S_{n-1} + u_1)$$

$$\text{ដោយ } S_{n-1} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}} \text{ និង } u_1 = -1$$

$$\text{ដូចនេះ } u_n = -\frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}} \quad \text{។}$$

IV-គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល ៖

$$(E): x^2y'' + (4x - 2x^2)y' + 2(x - 1)^2y = 0$$

$$(F): y'' - 2y' + 2y = 0$$

ក/ការបង្ហាញ

បើ $y = x^2f(x)$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (F) នោះ y, y', y''

ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងសមីការ (F) ។

$$\text{គេមាន } y' = 2xf(x) + x^2f'(x)$$

$$y'' = 2f(x) + 2xf'(x) + 2xf'(x) + x^2f''(x)$$

$$y'' = 2f(x) + 4xf'(x) + x^2f''(x)$$

យក y, y', y'' ជួសក្នុងសមីការ (F) គេបាន ៖

$$2f(x) + 4xf'(x) + x^2f''(x) - 4xf(x) - 2x^2f'(x) + 2x^2f(x) = 0$$

$$x^2f''(x) + (4x - 2x^2)f'(x) + 2(x - 1)^2f(x) = 0$$

ទំនាក់ទំនងនេះបញ្ជាក់ថាអនុគមន៍ f ជាចម្លើយរបស់ (E) ។

ខ/ដោះស្រាយសមីការ (F)

$$\text{គេមាន (F): } y'' - 2y' + 2y = 0$$

$$\text{សមីការសម្គាល់ } r^2 - 2r + 2 = 0$$

$$\Delta' = 1 - 2 = -1 = i^2$$

$$\text{គេទាញបាន } r_1 = 1 - i ; r_2 = 1 + i \text{ នាំឲ្យ } \alpha = 1, \beta = 1$$

$$\text{ដូចនេះ: } y = (A \cos x + B \sin x)e^x ; A, B \in \mathbb{R} \quad \text{។}$$

ទាញរកចម្លើយរបស់សមីការ (E)៖

$$\text{គេមាន } y = x^2 f(x) \text{ នាំឲ្យ } f(x) = \frac{y}{x^2} = (A \cos x + B \sin x) \frac{e^x}{x^2}$$

$$\text{ដូចនេះ: } f(x) = (A \cos x + B \sin x) \frac{e^x}{x^2} ; A, B \in \mathbb{R} \quad \text{។}$$

វិញ្ញាសាទី០៣

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{a^{2x}}{1+a^{2x-1}}$ ដែល $a > 0$ និង $a \neq 1$ ។

ចូរស្រាយថាគ្រប់ $\varphi \in \mathbf{IR}$ គេបាន $f(\sin^2 \varphi) + f(\cos^2 \varphi) = a$ ។

II-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (a_n) កំណត់ដោយ
$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt[3]{1+na_n^3}} \end{cases}$$

ដែល $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

ចូរគណនាកន្សោម a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

III-គេឲ្យសមីការ (E) : $z^2 - (4+3i)z + a + 9i = 0$

ក/កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឲ្យសមីការ(E)មានឫសមួយជាចំនួនពិត

ហើយឫសមួយទៀតជាចំនួនកុំផ្លិច។

ខ/ដោះស្រាយសមីការ(E)ចំពោះតម្លៃ a ដែលបានរកឃើញខាងលើ

IV-គេឲ្យអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^{\pi} x \sin^n x \cdot dx$ ដែល $n = 0, 1, 2, \dots$ ។

ក/ចូរស្រាយថា $I_n = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx$ ។

ខ/ចំពោះគ្រប់ $n \geq 2$ ស្រាយថា $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ ។

ដំណោះស្រាយ

I-ស្រាយថាគ្រប់ $\varphi \in \mathbb{R}$ គេបាន $f(\sin^2 \varphi) + f(\cos^2 \varphi) = a$

គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{a^{2x}}{1 + a^{2x-1}}$ ដែល $a > 0$ និង $a \neq 1$

យក $u = \sin^2 \varphi$ និង $v = \cos^2 \varphi$ នោះ $u + v = 1$ ។

យើងនឹងស្រាយថាបើ $u + v = 1$ នោះ $f(u) + f(v) = a$ ។

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } f(u) + f(v) &= \frac{a^{2u}}{1 + a^{2u-1}} + \frac{a^{2v}}{1 + a^{2v-1}} \\ &= \frac{a^{2u}(1 + a^{2v-1}) + a^{2v}(1 + a^{2u-1})}{(1 + a^{2u-1})(1 + a^{2v-1})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(u) + f(v) &= \frac{a^{2u} + a^{2u+2v-1} + a^{2v} + a^{2u+2v-1}}{1 + a^{2v-1} + a^{2u-1} + a^{2u+2v-2}} \text{ ដោយ } u + v = 1 \\
 &= \frac{a^{2u} + a^{2-1} + a^{2v} + a^{2-1}}{1 + a^{2v-1} + a^{2u-1} + a^{2-2}} \\
 &= \frac{a^{2u} + a^{2v} + 2a}{a^{2u-1} + a^{2v-1} + 2} \\
 &= \frac{a(a^{2u-1} + a^{2v-1} + 2)}{a^{2u-1} + a^{2v-1} + 2} = a
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $f(\sin^2 \varphi) + f(\cos^2 \varphi) = a$ ។

II-គណនាកន្សោម a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

គេមាន $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt[3]{\frac{a_n}{1 + na_n^3}}$ ដែល $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

លើកអង្គទាំងពីរជាគូបគេបាន $a_{n+1}^3 = \frac{a_n^3}{1 + na_n^3}$

គេទាញ $\frac{1}{a_{n+1}^3} = \frac{1 + na_n^3}{a_n^3} = \frac{1}{a_n^3} + n$ ឬ $\frac{1}{a_{n+1}^3} - \frac{1}{a_n^3} = n$

គេបាន $\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_{k+1}^3} - \frac{1}{a_k^3} \right) = \sum_{k=1}^{n-1} (k)$

$$\text{នាំឲ្យ } \left(\frac{1}{a_2^3} - \frac{1}{a_1^3}\right) + \left(\frac{1}{a_3^3} - \frac{1}{a_2^3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{a_n^3} - \frac{1}{a_{n-1}^3}\right) = \frac{(n-1)n}{2}$$

$$\text{ឬ } \frac{1}{a_n^3} - \frac{1}{a_1^3} = \frac{n^2 - n}{2} \quad \text{ដោយ } a_1 = 1$$

$$\text{ដូចនេះ } a_n = \sqrt[3]{\frac{2}{n^2 - n + 2}} \quad \text{។}$$

III-គេឲ្យសមីការ (E) : $z^2 - (4 + 3i)z + a + 9i = 0$

ក/កំណត់តម្លៃ a ៖

តាង $z = \alpha$ ជាឬសពិតមួយរបស់សមីការ (E) នោះវាផ្ទៀងផ្ទាត់

នឹងសមីការ (E) គឺ $\alpha^2 - (4 + 3i)\alpha + a + 9i = 0$

$$\text{ឬ } (\alpha^2 - 4\alpha + a) + i(3\alpha - 9) = 0 \quad \text{នាំឲ្យ } \begin{cases} \alpha^2 - 4\alpha + a = 0 \\ 3\alpha - 9 = 0 \end{cases}$$

គេទាញ $\alpha = 3$ ហើយ $9 - 4(3) + a = 0$ នោះ $a = 3$ ។

ដូចនេះ $a = 3$ ។

ខ/ដោះស្រាយសមីការ(E)៖

តាមទ្រឹស្តីបទវ៉ៃត បើ α, β ជាឫសរបស់សមីការ (E) នោះគេបាន

$$\alpha + \beta = 4 + 3i \quad \text{តែតាមសម្រាយខាងលើ} \quad \alpha = 3 \quad \text{នោះ} \quad \beta = 1 + 3i \quad \text{។}$$

ដូចនេះឫសសមីការគឺ $\alpha = 3 ; \beta = 1 + 3i$ ។

IV-ក/ស្រាយថា
$$I_n = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx$$

គេមាន
$$I_n = \int_0^{\pi} x \sin^n x \cdot dx \quad \text{ដែល} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

តាង $x = \pi - t$ នោះ $dx = -dt$

បើ $x = 0$ នោះ $t = \pi$ និង $x = \pi$ នោះ $t = 0$

គេបាន
$$I_n = \int_{\pi}^0 (\pi - t) \sin^n(\pi - t) (-dt)$$

$$I_n = \int_0^{\pi} (\pi - t) \sin^n t \cdot dt = \pi \int_0^{\pi} \sin^n t \cdot dt - \int_0^{\pi} t \sin^n t \cdot dt$$

$$I_n = \pi \int_0^{\pi} \sin^n x \cdot dx - I_n \quad \text{នាំឱ្យ} \quad I_n = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin^n x \cdot dx \quad (1)$$

$$\text{គេមាន} \quad \int_0^{\pi} \sin^n x \cdot dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n x \cdot dx \quad (2)$$

តាង $x = \pi - t$ នៅ៖ $dx = -dt$

បើ $x = \frac{\pi}{2}$ នៅ៖ $t = \frac{\pi}{2}$ និង $x = \pi$ នៅ៖ $t = 0$

$$\text{គេបាន} \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n x \cdot dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n(\pi - t)(-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cdot dt \quad (3)$$

$$\text{តាម (2) និង (3) គេបាន} \quad \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^n x \cdot dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx \quad (4)$$

យក (4) ជំនួសក្នុង (1) គេបាន $I_n = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx$ ពិត ។

ខ/ចំពោះគ្រប់ $n \geq 2$ ស្រាយថា $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

$$\text{គេមាន } I_n = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx$$

$$\text{តាង } \begin{cases} u = \sin^{n-1} x \\ dv = \sin x \cdot dx \end{cases} \quad \text{នាំឱ្យ} \quad \begin{cases} du = (n-1) \cos x \sin^{n-2} x \cdot dx \\ v = \int \sin x \, dx = -\cos x \end{cases}$$

$$I_n = \pi \left[-\sin^{n-1} x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^{n-2} x \cdot dx$$

$$I_n = (n-1) \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} x \cdot dx$$

$$I_n = (n-1) \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cdot dx - (n-1) \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot dx$$

$$I_n = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n$$

$$\text{គេទាញ } n I_n = (n-1) I_{n-2} \quad \text{ឬ} \quad I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ } I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad \text{។}$$

វិញ្ញាសាទី០៤

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ ៖

$$f_m(x) = x^3 - (m+4)x^2 + 2(2m+3)x - 4m + 3 \text{ មានក្រាប } (c_m)$$

(m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិត) ។

ចូរកំណត់សមីការបន្ទាត់ថេរ (Δ) មួយដែលប៉ះនឹងខ្សែកោង (c_m)

ជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m ។

$$\text{II-គេឲ្យស្លឹក } (a_n) \text{ កំណត់ដោយ } \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{2^n}) \end{cases}$$

ដែល $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

$$\text{ក/រកប្រភេទនៃស្លឹក } b_n = a_n - \frac{n}{2^n} \text{ ។}$$

ខ/គណនា a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

III-គេឲ្យអាំងតេក្រាល ៖

$$I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} .dx \quad \text{និង} \quad J_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} .dx$$

ក/ចូរស្រាយថា $I_n = J_n$ ។

ខ/គណនា I_n និង J_n ។

IV-គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់ពីសំណុំ $\mathbb{R}$ ទៅ $\mathbb{R}$ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់

$$\text{សមីការ } f(x+1) + x^2 f(x^3 + 1) = x^3 + \sqrt[3]{x} \quad \text{គ្រប់ } x \in \mathbb{R} \text{ ។}$$

$$\text{ចូរគណនាអាំងតេក្រាល } I = \int_1^2 f(x).dx \text{ ។}$$

V-ចូរកំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z ដែលមានម៉ូឌុល $|z|$ ដោយដឹងថា ៖

$$|z| + (1+i)z = 4 + 7i \text{ ។}$$

ដំណោះស្រាយ

I-កំណត់សមីការបន្ទាត់ថេរ (Δ)

$$\text{គេមាន } f_m(x) = x^3 - (m+4)x^2 + 2(2m+3)x - 4m + 3$$

តាង (Δ): $y = \alpha x + \beta$ ជាបន្ទាត់ថេរដែលប៉ះនឹង (c_m) ត្រង់ចំនុច

$M_0(x_0, y_0)$ ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{R}$ ។

$$\text{សមមូលគេបាន } \begin{cases} f(x_0) = \alpha x_0 + \beta \\ f'(x_0) = \alpha \end{cases}$$

$$\text{ដោយ } f'(x) = 3x^2 - 2(m+4)x + 2(2m+3)$$

$$\text{គេបាន } \begin{cases} x_0^3 - (m+4)x_0^2 + 2(2m+3)x_0 - 4m + 3 = \alpha x_0 + \beta \\ 3x_0^2 - 2(m+4)x_0 + 2(2m+3) = \alpha \end{cases}$$

$$\text{សមមូល } \begin{cases} x_0^3 - 4x_0^2 + 6x_0 - \alpha x_0 - \beta + 3 = m(x_0^2 - 4x_0 + 4) \\ 3x_0^2 - 8x_0 + 6 - \alpha = m(2x_0 - 4) \end{cases}$$

ប្រពន្ធនេះពិត $\forall m \in \mathbb{R}$ លុះត្រាតែ ៖

$$\begin{cases} x_0^3 - 4x_0^2 + 6x_0 - \alpha x_0 - \beta + 3 = 0 & (1) \\ x_0^2 - 4x_0 + 4 = 0 & (2) \\ 3x_0^2 - 8x_0 + 6 - \alpha = 0 & (3) \\ 2x_0 - 4 = 0 & (4) \end{cases}$$

តាមសមីការ (2) និង (4) គេទាញបាន $x_0 = 2$ ។

តាមសមីការ (3) គេបាន $3(2)^2 - 8(2) + 6 - \alpha = 0$ នាំឱ្យ $\alpha = 2$

តាម (1) គេបាន $8 - 16 + 12 - 4 - \beta + 3 = 0$ នាំឱ្យ $\beta = 3$ ។

ដូចនេះ $(\Delta): y = 2x + 3$ ។

II-ក/រកប្រភេទនៃស្វ៊ីត $b_n = a_n - \frac{n}{2^n}$

គេបាន $b_n = a_n - \frac{n}{2^n}$ នាំឱ្យ $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{n+1}{2^{n+1}}$

ដោយ $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{2^n})$

គេបាន $b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{1}{2^n}) - \frac{n+1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}(a_n - \frac{1}{2^n}) = \frac{1}{2}b_n$

ដូចនេះ (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានស្មុំ $q = \frac{1}{2}$ ។

គណិតវិទ្យាអោរូបករណ៍

ខ/គណនា a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

ដោយ (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានស្មើ $q = \frac{1}{2}$ និងតួទីមួយ

$$b_1 = a_1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ នៅ: } b_n = b_1 \times q^{n-1} = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^n}$$

$$\text{តាម } b_n = a_n - \frac{n}{2^n} \text{ នៅ: } a_n = b_n + \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2^n}$$

$$\text{ដូចនេះ: } a_n = \frac{n+1}{2^n} \quad \text{។}$$

III- /ចូរស្រាយថា $I_n = J_n$

$$\text{មាន } I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} .dx \quad \text{និង } J_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} .dx$$

$$\text{ចំពោះ: } I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} .dx \quad \text{តាង } x = \frac{\pi}{2} - t \text{ នៅ: } dx = -dt$$

$$\text{បើ } x = \frac{\pi}{6} \text{ នៅ: } t = \frac{\pi}{3} \quad \text{និង } x = \frac{\pi}{3} \text{ នៅ: } t = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{គេបាន } I_n = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^n(\frac{\pi}{2} - t)}{\sin^n(\frac{\pi}{2} - t) + \cos^n(\frac{\pi}{2} - t)} \cdot (-dt)$$

$$I_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^n t}{\cos^n t + \sin^n t} \cdot dt = J_n$$

ដូចនេះ $I_n = J_n$ ។

ខ/គណនា I_n និង J_n ៖

$$\text{គេបាន } I_n + J_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \cdot dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} \cdot dx$$

$$I_n + J_n = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} dx = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \quad \text{តែ } I_n = J_n$$

នោះ $2I_n = 2J_n = \frac{\pi}{6}$ នាំឱ្យ $I_n = J_n = \frac{\pi}{12}$ ។

ដូចនេះ $I_n = \frac{\pi}{12}$ និង $J_n = \frac{\pi}{12}$ ។

IV-គណនាអាំងតេក្រាល $I = \int_1^2 f(x).dx$

-បើគេដាក់ $x = t + 1$ នោះ $dx = dt$

ចំពោះ $x = 1$ នោះ $t = 0$ និង $x = 2$ នោះ $t = 1$ ។

គេបាន $I = \int_1^2 f(x).dx = \int_0^1 f(t+1).dt \quad (1)$

-បើគេដាក់ $x = t^3 + 1$ នោះ $dx = 3t^2 dt$

ចំពោះ $x = 1$ នោះ $t = 0$ និង $x = 2$ នោះ $t = 1$ ។

គេបាន $I = \int_1^2 f(x).dx = 3 \int_0^1 t^2 f(t+1).dt$

ឬ $\frac{1}{3}I = \int_0^1 t^2 f(t^3 + 1).dt \quad (2)$

បូកសមីការ (1) និង (2) គេបាន ៖

$$I + \frac{1}{3}I = \int_0^1 [f(t+1) + t^2 f(t^3 + 1)].dt$$

ដោយ $f(x+1) + x^2 f(x^3 + 1) = x^3 + \sqrt[3]{x}$ គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

$$\text{គេបាន } \frac{4}{3}I = \int_0^1 (t^3 + \sqrt[3]{t}) \cdot dt = \left[\frac{1}{4}t^4 + \frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}} \right]_0^1 = 1$$

$$\text{ដូចនេះ: } I = \frac{3}{4} \quad \text{។}$$

V- កំណត់ចំនួនកុំផ្លិច z ដែលមានម៉ូឌុល $|z|$

$$\text{គេមាន } |z| + (1+i)z = 4 + 7i \quad (1)$$

$$\text{តាង } z = x + iy \text{ ដែល } x, y \in \mathbb{R} \quad \text{។}$$

សមីការ (1) អាចសរសេរ ៖

$$\sqrt{x^2 + y^2} + (1+i)(x+iy) = 4 + 7i$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} + x + iy + ix - y = 4 + 7i$$

$$(\sqrt{x^2 + y^2} + x - y) + i(x + y) = 4 + 7i$$

$$\text{គេទាញបាន } \begin{cases} x + y = 7 & (2) \\ \sqrt{x^2 + y^2} + x - y = 4 & (3) \end{cases}$$

បន្ទាប់ពីដោះស្រាយគេបានគូចម្លើយ $x = 3, y = 4$

ដូចនេះចំនួនកុំផ្លិចដែលត្រូវរកគឺ $z = 3 + 4i$ ។

វិញ្ញាសាទី០៥

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{(3m+1)x + m - m^2}{x+m}$

ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង $m \neq 0$ ។ (H_m) ជាក្រាបតាង f ។

ក/ចូរស្រាយថា f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើដែនកំណត់របស់វា។

ខ/កំណត់សមីការបន្ទាត់នឹងមួយដែលប៉ះ (H_m) ជានិច្ចគ្រប់ m ។

II-គេមានអនុគមន៍ $g(x) = 2\cos^2 x - \cos x + 1$ ដែល $x \in \mathbb{R}$

ក/ចូរកំណត់តម្លៃតូចបំផុតនៃ $g(x)$ ។

ខ/តាង $S_n = \sum_{k=0}^n g\left(\frac{x}{2^k}\right)$ ។ ចូរគណនា $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ។

III-គេឲ្យអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^1 \frac{t^{3n}}{1+t^3} dt$ ដែល $n = 0, 1, 2, \dots$ ។

ចូរគណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n)$ ។

IV-ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំកុំផ្លិច ៖

$$\text{ក/ } z^2 - 4z + 7 - 4i = 0$$

$$\text{ខ/ } (1+i)z^2 - 2(1+3i)z + 1+5i = 0 \quad \text{។}$$

ជំនួសស្រាយ

I-ក/ស្រាយថា f ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើដែនកំណត់របស់វា

$$\text{គេមាន } f(x) = \frac{(3m+1)x + m - m^2}{x+m}$$

$$\text{ដែនកំណត់ } D_f = \mathbb{R} - \{-m\}$$

ដេរីវេ ៖

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3m+1)(x+m) - (3m+1)x - m + m^2}{(x+m)^2} \\ &= \frac{(3m+1)x + 3m^2 + m - (3m+1)x - m + m^2}{(x+m)^2} \\ &= \frac{4m^2}{(x+m)^2} > 0 \quad \forall x \in D_f ; m \neq 0 \end{aligned}$$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍កើនលើដែនកំណត់ D_f ។

ខ/កំណត់សមីការបន្ទាត់នឹងមួយដែលប៉ះ (H_m) ជានិច្ចគ្រប់ m ៖

តាង $(d): y = ax + b$ ជាបន្ទាត់ដែលត្រូវរក ។

សមីការអាប់ស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាង (d) និង (H_m)

$$\frac{(3m+1)x + m - m^2}{x + m} = ax + b$$

$$(x + m)(ax + b) = (3m + 1)x + m - m^2$$

$$ax^2 + (am + b)x + bm = (3m + 1)x + m - m^2$$

$$ax^2 + (am - 3m + b - 1)x + (bm - m + m^2) = 0 \quad (1)$$

ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ (d) ប៉ះនឹង (H_m) លុះត្រាតែសមីការ(1)មានឬស

ឌុបចំពោះគ្រប់តម្លៃ m ពេលគឺ $\Delta = 0$ គ្រប់ m ។

$$\begin{aligned} \Delta &= (am - 3m + b - 1)^2 - 4a(bm - m + m^2) \\ &= (a^2 - 10a + 9)m^2 - 2(a + 3)(b - 1)m + (b - 1)^2 \end{aligned}$$

$$\forall m \in \mathbb{R} : \Delta = 0 \text{ សម្រាប់ } \begin{cases} a^2 - 10a + 9 = 0 \\ (a + 3)(b - 1) = 0 \\ (b - 1)^2 = 0 \end{cases}$$

គេទាញបាន $a = 1, b = 1$ ឬ $a = 9, b = 1$ ។

ដូចនេះ $(d_1): y = x + 1$ និង $(d_2): y = 9x + 1$ ។

II- គេមានអនុគមន៍ $g(x) = 2\cos^2 x - \cos x + 1$ ដែល $x \in \mathbb{R}$

ក/កំណត់តម្លៃតូចបំផុតនៃ $g(x)$

គេមាន $g(x) = 2\cos^2 x - \cos x + 1$

$$= \left(\sqrt{2} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{7}{8}$$

ដើម្បីឲ្យ $g(x)$ មានតម្លៃតូចបំផុតលុះត្រាតែ ៖

$$\sqrt{2} \cos x - \frac{1}{2\sqrt{2}} = 0 \quad \text{ឬ} \quad \cos x = \frac{1}{4} \quad \text{។}$$

ដូចនេះតម្លៃតូចបំផុតនៃ $g(x)$ គឺ $g_{\min}(x) = \frac{7}{8}$,

ខ/គណនា $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

គេមាន $S_n = \sum_{k=0}^n g\left(\frac{x}{2^k}\right)$ ដោយ $2\cos^2 x - 1 = \cos 2x$

នោះ $g(x) = 2\cos^2 x - 1 - \cos x = \cos 2x - \cos x$

$$\text{គេបាន } S_n = \sum_{k=0}^n \left(\cos \frac{x}{2^{k-1}} - \cos \frac{x}{2^k} \right) = \cos 2x - \cos \frac{x}{2^n}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\cos 2x - \cos \frac{x}{2^n} \right) = \cos 2x - 1 = -2 \sin^2 x$$

III-គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n I_n)$

$$\text{គេមាន } I_n = \int_0^1 \frac{t^{3n}}{1+t^3} \cdot dt \quad \text{ដែល } n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{គេបាន } I_{n+1} = \int_0^1 \frac{t^{3n+3}}{1+t^3} \cdot dt$$

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{t^{3n} + t^{3n+3}}{1+t^3} \cdot dt = \int_0^1 t^{3n} \cdot dt = \left[\frac{t^{3n+1}}{3n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{3n+1}$$

$$I_n + I_{n+1} = \frac{1}{3n+1} \quad (1) \quad \text{និង } I_{n-1} + I_n = \frac{1}{3n-2} \quad (2)$$

$$\text{គ្រប់ } t \in [0, 1] \text{ គេមាន } t^{3n} \geq t^{3n+3} \text{ នាំឱ្យ } \frac{t^{3n}}{1+t^3} \geq \frac{t^{3n+3}}{1+t^3}$$

$$\text{គេទាញ } \int_0^1 \frac{t^{3n}}{1+t^3} dt \geq \int_0^1 \frac{t^{3n+3}}{1+t^3} \cdot dt \quad \text{ឬ } I_n \geq I_{n+1} \text{ គ្រប់ } n = 0, 1, 2, \dots$$

នាំឲ្យ (I_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។ តាមលក្ខណៈនៃស្វ៊ីតចុះគេបាន ៖

$$I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1} \quad \text{នាំឲ្យ} \quad \frac{I_{n+1} + I_n}{2} \leq I_n \leq \frac{I_n + I_{n-1}}{2} \quad (3)$$

យកទំនាក់ទំនង(1)និង(2)ជំនួសក្នុង(3)គេបាន ៖

$$\frac{1}{6n+2} \leq I_n \leq \frac{1}{6n-4} \quad \text{នាំឲ្យ} \quad \frac{n}{6n+2} \leq nI_n \leq \frac{n}{6n-4}$$

$$\text{ដោយ} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{6n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{6n-4} = \frac{1}{6}$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n) = \frac{1}{6} \quad \text{។}$$

IV-ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំកុំផ្លិច ៖

$$\text{ក/ } z^2 - 4z + 7 - 4i = 0$$

$$(z-2)^2 - (1+2i)^2 = 0 \quad \text{នាំឲ្យ} \quad z_1 = 3+2i, \quad z_2 = 1-2i \quad \text{។}$$

$$\text{ខ/ } (1+i)z^2 - 2(1+3i)z + 1+5i = 0$$

$$\text{ដោយ } a+b+c=0 \quad \text{គេទាញប្រស } z_1 = 1, \quad z_2 = \frac{1+5i}{1+i} = 3+2i$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad z_1 = 1; \quad z_2 = 3+2i \quad \text{។}$$

វិញ្ញាសាទី០៦

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេឲ្យអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^n \frac{dx}{8x^2 + 6x + 1}$ ដែល $n > 0$

គណនា I_n ជាអនុគមន៍នៃ n រួចទាញរកលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ ។

II-គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{\tan \frac{x}{2}}{\cos x}$ ដែល $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ។

ក/ចូរកំណត់ពីរចំនួនពិត a និង b ដើម្បីបាន ៖

$$f(x) = \frac{a}{\sin 2x} + \frac{b}{\sin x} \quad \text{គ្រប់ } x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

ខ/តាង $S_n = \sum_{k=0}^n 2^k f(\frac{x}{2^k})$ ។ គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ។

III-គេឲ្យសមីការ (E) : $x^3 + px + q = 0$

ក/កំណត់ពីរចំនួនពិត p និង q ដើម្បីឲ្យ $x = 1 + 2i$ ជាឫសនៃ (E) ។

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

ខ/ចំពោះតម្លៃ p និង q ដែលបានរកឃើញខាងលើចូរដោះស្រាយ (E)

IV-គេឲ្យអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ ៖

$$f(x) = \frac{(2m+1)x^2 - (m^2-1)x + 4}{x} \quad \text{មានក្រាបតំនាង } (c_m)$$

(m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង $m \neq -\frac{1}{2}$) ។

ក/កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (c_m) ។

ខ/កំណត់សមីការប៉ារ៉ាបូលនឹង (P) មួយដែលប៉ះនឹងអាស៊ីមតូត

ទ្រេតនៃក្រាប (c_m) ជានិច្ចគ្រប់ m ។ ចូរសង់ (P) ។

ជំនួញស្រាយ

I-គណនា I_n ជាអនុគមន៍នៃ n រួចទាញរកលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

$$\text{គេមាន } I_n = \int_0^n \frac{dx}{8x^2 + 6x + 1} \quad \text{ដែល } n > 0$$

$$\text{តាង } f(x) = \frac{1}{8x^2 + 6x + 1} = \frac{1}{(2x+1)(4x+1)}$$

សរសេរ $f(x)$ ជាពងកាណូនិច $f(x) = \frac{a}{2x+1} + \frac{b}{4x+1}$

គេបាន $\frac{a}{2x+1} + \frac{b}{4x+1} = \frac{1}{8x^2 + 6x + 1}$

នាំឲ្យ $a(4x+1) + b(2x+1) = 1$

ឬ $(4a+2b)x + (a+b) = 1$

គេទាញ $\begin{cases} 4a+2b=0 \\ a+b=1 \end{cases}$ នាំឲ្យ $a=-1, b=2$

គេបាន $f(x) = -\frac{1}{2x+1} + \frac{2}{4x+1}$

$$I_n = \int_0^n f(x).dx = \int_0^n \left(\frac{2}{4x+1} - \frac{1}{2x+1} \right).dx$$

$$= \int_0^n \frac{2dx}{4x+1} - \int_0^n \frac{dx}{2x+1}$$

$$= \frac{1}{2} [\ln |4x+1|]_0^n - \frac{1}{2} [\ln |2x+1|]_0^n$$

$$= \frac{1}{2} \ln(4n+1) - \frac{1}{2} \ln(2n+1) = \ln \sqrt{\frac{4n+1}{2n+1}}$$

ដូចនេះ $I_n = \ln \sqrt{\frac{4n+1}{2n+1}}$ និង $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\frac{4n+1}{2n+1}} = \ln \sqrt{2}$ ។

II-គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{\tan \frac{x}{2}}{\cos x}$ ដែល $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ។

ក/កំណត់ពីរចំនួនពិត a និង b ៖

គេមាន $f(x) = \frac{a}{\sin 2x} + \frac{b}{\sin x}$ គ្រប់ $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

គេបាន $\frac{a}{\sin 2x} + \frac{b}{\sin x} = \frac{\tan \frac{x}{2}}{\cos x}$

$$\frac{a + 2b \cos x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos x \cos \frac{x}{2}} = \frac{4 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin x \cos x} = \frac{2(1 - \cos x)}{2 \sin x \cos x}$$

គេទាញបាន $a + b \cos x = 2 - 2 \cos x$ នាំឱ្យ $a = 2, b = -1$ ។

ដូចនេះ $a = 2, b = -1$ ។

ខ/ គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

គេមាន $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} f\left(\frac{x}{2^k}\right)$ ដោយ $f(x) = \frac{2}{\sin 2x} - \frac{1}{\sin x}$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } S_n &= \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2^{k-1} \sin \frac{x}{2^{k-1}}} - \frac{1}{2^k \sin \frac{x}{2^k}} \right) \\ &= \frac{2}{\sin 2x} - \frac{1}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sin 2x} - \frac{1}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \right) = \frac{2}{\sin 2x} - \frac{1}{x}$$

$$\text{ដូចនេះ: } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2x - \sin 2x}{x \sin 2x} \quad \text{។}$$

III-គេឲ្យសមីការ (E) : $x^3 + px + q = 0$

ក/កំណត់ពីរចំនួនពិត p និង q

ដើម្បីឲ្យ $x = 1 + 2i$ ជាឫសនៃ (E) លុះត្រាតែវាផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

$$\text{គេបាន } (1+2i)^3 + p(1+2i) + q = 0$$

$$1 + 6i - 12 - 8i + p + 2ip + q = 0$$

$$(-11 + p + q) + i(2p - 2) = 0$$

$$\text{គេទាញ } \begin{cases} 2p - 2 = 0 \\ -11 + p + q = 0 \end{cases} \text{ នាំឲ្យ } p = 1, q = 10$$

$$\text{ដូចនេះ: } p = 1, q = 10 \quad \text{។}$$

ខ/ ដោះស្រាយសមីការ(E)

$$\text{ចំពោះ } p = 1, q = 10 \text{ គេបាន } x^3 + x + 10 = 0$$

$$\text{គេអាចសរសេរ } x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 4x + 5x + 10 = 0$$

$$x^2(x+2) - 2x(x+2) + 5(x+2) = 0$$

$$(x+2)(x^2 - 2x + 5) = 0$$

$$\text{-បើ } x+2=0 \text{ នោះ: } x=-2$$

$$\text{-បើ } x^2 - 2x + 5 = 0, \Delta' = 1 - 5 = -4 = (2i)^2$$

$$\text{គេទាញបាន } x_1 = 1 - 2i; x_2 = 1 + 2i \quad \text{។}$$

$$\text{សរុបមកសមីការមានឫសបី } x \in \{-2, 1 - 2i, 1 + 2i\} \quad \text{។}$$

IV-ក/កំណត់សមីការអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប(c_m)

$$\text{គេមាន } f(x) = \frac{(2m+1)x^2 - (m^2-1)x + 4}{x}$$

$$\text{គេបាន } f(x) = (2m+1)x - m^2 + 1 + \frac{4}{x} \text{ ដោយ } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 0$$

ដូចនេះបន្ទាត់ (d): $y = (2m+1)x - m^2 + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត
របស់ខ្សែកោង(c_m) តាង f ។

ខ/កំណត់សមីការប៉ារ៉ាបូលនឹង(P) ៖

តាង (p): $y = ax^2 + bx + c$ ជាប៉ារ៉ាបូលនឹងដែលត្រូវរក ។

សមីការអាប់ស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាង (P) និង (d) ៖

$$ax^2 + bx + c = (2m+1)x - m^2 + 1$$

$$ax^2 + (b - 2m - 1)x + m^2 + c - 1 = 0 \quad (1)$$

ដើម្បីឲ្យ (d) ប៉ះនឹង (P) ជានិច្ចគ្រប់ m លុះត្រាតែសមីការ (1)

មានឬសឌុបជានិច្ចគ្រប់ m ពេលគឺគេត្រូវឲ្យ $\Delta = 0$ គ្រប់ m ។

$$\text{គេមាន } \Delta = (b - 2m - 1)^2 - 4a(m^2 + c - 1)$$

គណិតវិទ្យាធាតុបឋម

$$\Delta = (b-1)^2 - 4m(b-1) + 4m^2 - 4am^2 - 4ac + 4a$$


$$\Delta = (4-4a)m^2 - 4(b-1)m + [(b-1)^2 - 4ac + 4a]$$

ដើម្បីឲ្យ $\Delta = 0$ គ្រប់ m លុះត្រាតែ $\begin{cases} 4-4a=0 \\ b-1=0 \\ (b-1)^2 - 4ac + 4a=0 \end{cases}$

គេទាញបាន $a=1, b=1, c=1$ ។

ដូចនេះ (P): $y = x^2 + x + 1$ ជាប៉ារ៉ាបូលដែលត្រូវរក ។

សង់ប៉ារ៉ាបូល (P): $y = x^2 + x + 1$



វិញ្ញាសាទី០៧

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេឲ្យអាំងតេក្រាល $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} x^3 e^{-x^2} .dx$ ដែល $\alpha > 0$ ។

គណនា I_α ជាអនុគមន៍នៃ α រួចគណនា $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha$ ។

II-គេឲ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (t_n) កំណត់ដោយ ៖

$$t_0 = \frac{1}{7} \text{ និង ទំនាក់ទំនងកំណើន } t_{n+1} = \frac{\sqrt[3]{t_n}}{\sqrt[3]{1+t_n} - \sqrt[3]{t_n}}$$

ដែល $n = 0, 1, 2, \dots$ ។

ក/តាង $u_n = \ln(1 + \frac{1}{t_n})$ ។ ស្រាយថា (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ខ/គណនាតួ u_n និង t_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

III-រកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $y = \cos 2x - 4\cos^2 \frac{x}{2} + 1$ មានតម្លៃអប្បបរមា

រួចកំណត់តម្លៃអប្បបរមានោះ ។

IV-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល (P) : $y = x^2 - 4x + 5$

ក/កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និង កំណុំរបស់ (P) រួចសង់ (P)

ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ។

ខ/គេគូសបន្ទាត់ (d) មួយមានមេគុណប្រាប់ទិស m ចេញពី

ចំណុចនឹង I មួយ ។ បន្ទាត់ (d) កាត់ (P) បានពីរចំណុច A និង B ។

កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនឹង I ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ប៉ះ (P) ត្រង់

ចំណុច A និង B កែងនឹងគ្នាជានិច្ចគ្រប់តម្លៃ m ។

ដំណោះស្រាយ

I-គណនា I_α ជាអនុគមន៍នៃ α រួចគណនា $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha$

គេមាន $I_\alpha = \int_0^{\sqrt{\alpha}} x^3 e^{-x^2} .dx$ ដែល $\alpha > 0$

តាង $\begin{cases} u = x^2 \\ dv = x e^{-x^2} dx \end{cases}$ នាំឲ្យ $\begin{cases} du = 2x .dx \\ v = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \end{cases}$

$$\begin{aligned}\text{គេបាន } I_\alpha &= \left[-\frac{x^2}{2} e^{-x^2} \right]_0^{\sqrt{\alpha}} + \int_0^{\sqrt{\alpha}} x e^{-x^2} .dx \\ &= -\frac{\alpha}{2} e^{-\alpha} - \left[\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^{\sqrt{\alpha}} \\ &= -\frac{1}{2} \alpha e^{-\alpha} - \left(\frac{1}{2} e^{-\alpha} - \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } I_\alpha = \frac{1}{2} - \frac{\alpha+1}{2} e^{-\alpha} \quad \text{និង} \quad \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I_\alpha = \frac{1}{2} \quad \text{។}$$

II-ក/ស្រាយថា (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

$$\text{សម្មតិកម្ម } t_0 = \frac{1}{7} \quad \text{និង} \quad t_{n+1} = \frac{\sqrt[3]{t_n}}{\sqrt[3]{1+t_n} - \sqrt[3]{t_n}}$$

$$\text{គេមាន } u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{t_n}\right) \quad \text{នាំឱ្យ } u_{n+1} = \ln\left(1 + \frac{1}{t_{n+1}}\right)$$

$$\text{ដោយ } t_{n+1} = \frac{\sqrt[3]{t_n}}{\sqrt[3]{1+t_n} - \sqrt[3]{t_n}} \quad \text{នោះគេបាន} \div$$

$$u_{n+1} = \ln\left(1 + \frac{\sqrt[3]{1+t_n} - \sqrt[3]{t_n}}{\sqrt[3]{t_n}}\right) = \ln\left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{t_n}}\right) = \frac{1}{3} \ln\left(1 + \frac{1}{t_n}\right)$$

គេបាន $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n$ នាំឲ្យ (u_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានរេសុង

$$q = \frac{1}{3} \quad \text{និង} \quad u_0 = \ln\left(1 + \frac{1}{t_0}\right) = \ln 8 \quad \text{។}$$

ខ/គណនាតួ u_n និង t_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

$$\text{តាមរូបមន្ត} \quad u_n = u_0 \times q^n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \ln 8$$

$$\text{ហើយ} \quad u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{t_n}\right) = \frac{1}{3^n} \ln 8$$

$$\text{គេទាញ} \quad 1 + \frac{1}{t_n} = 8^{\frac{1}{3^n}} \quad \text{នាំឲ្យ} \quad t_n = \frac{1}{8^{\frac{1}{3^n}} - 1} \quad \text{។}$$

$$\text{ដូចនេះ} \quad u_n = \frac{1}{3^n} \ln 8 \quad \text{និង} \quad t_n = \frac{1}{8^{\frac{1}{3^n}} - 1} \quad \text{។}$$

III-កត់ម៉ែ x

$$\text{គេមាន} \quad y = \cos 2x - 4\cos^2 \frac{x}{2} + 1$$

$$= 2\cos^2 x - 1 - 2(1 + \cos x) + 1$$

$$y = 2\cos^2 x - 2\cos x - 2$$

$$y = \frac{1}{2}(2\cos x - 1)^2 - \frac{3}{2}$$

ដើម្បីឲ្យ y មានតម្លៃតូចបំផុតលុះត្រាតែ $2\cos x - 1 = 0$

គេបាន $\cos x = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$ នាំឲ្យ $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

ដូចនេះ $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$ និង $y_{\min} = -\frac{3}{2}$ ។

IV-គេឲ្យប៉ារ៉ាបូល (P): $y = x^2 - 4x + 5$

ក/កំណត់កូអរដោនេនៃកំពូល និង កំណុំរបស់ (P) ៖

គេមាន $y = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ ឬ $(x - 2)^2 = y - 1$ ។


ដោយប្រៀបធៀបជាមួយសមីការ $(x - h)^2 = 4p(y - k)$

គេទាញ $h = 2, p = \frac{1}{4}, k = 1$ ។

ដូចនេះកូអរដោនេកំពូល $S(h, k) = S(2, 1)$

និងកំណុំ $F(h, k + p) = F(2; \frac{5}{4})$ ។

ខ/កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនឹង I ៖



តាង $I(\alpha, \beta)$ ជាចំណុចនឹងដែលត្រូវរក ។

សមីការបន្ទាត់ (d) : $y = m(x - \alpha) + \beta$

សមីការអាប់ស៊ីសចំណុចប្រសព្វរវាង (d) និង (P) ៖

$$x^2 - 4x + 5 = mx - m\alpha + \beta$$

$$\text{ឬ } x^2 - (m + 4)x + m\alpha - \beta + 5 = 0 \quad (1)$$

គណិតវិទ្យាធាតុបឋម

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (P) ត្រង់ A និង B គឺ ៖

$$y'_A = 2x_A - 4 \quad \text{និង} \quad y'_B = 2x_B - 4 \quad \text{។}$$

ដើម្បីឲ្យបន្ទាត់ប៉ះ (P) ត្រង់ចំណុច A និង B កែងនឹងគ្នាជានិច្ច

គ្រប់តម្លៃ m លុះត្រាតែ $y'_A \cdot y'_B = -1$ គ្រប់ m ។

$$\text{គេបាន } (2x_A - 4)(2x_B - 4) = -1$$

$$4x_A x_B - 8(x_A + x_B) + 17 = 0 \quad (1)$$

ដោយ x_A និង x_B ជាឫសនៃសមីការ (1) នោះតាមទ្រឹស្តីបទវ្យែត

$$\text{គេបាន } \begin{cases} x_A + x_B = m + 4 & (2) \\ x_A x_B = m\alpha - \beta + 5 & (3) \end{cases}$$

យក (2) និង (3) ជួសក្នុង (1) គេបាន ៖

$$4(m\alpha - \beta + 5) - 8(m + 4) + 7 = 0$$

$$(4\alpha - 8)m = 4\beta + 5$$

$$\text{សមីការនេះផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ } m \text{ លុះត្រាតែ } \begin{cases} 4\alpha - 8 = 0 \\ 4\beta + 5 = 0 \end{cases}$$

$$\text{គេទាញ } \alpha = 2 ; \beta = -\frac{5}{4} \quad \text{។ ដូចនេះ } I(2, -\frac{5}{4}) \quad \text{។}$$

វិញ្ញាសាទី០៨

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គណនាលីមីត $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2} \tan \frac{\pi x}{2x+1}$

II-គេមានអនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos 3x}$ ដែល $0 < x < \frac{\pi}{6}$

ក/ចូរស្រាយថា $f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - \frac{1}{\cos x} \right)$ គ្រប់ $0 < x < \frac{\pi}{6}$ ។

ខ/គណនា $S_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{x}{3^k}\right)$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ ។

III-គេមានអាំងតេក្រាល $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + x + 1} \cdot dx$ ដែល $n = 0, 1, 2, \dots$

ក/ស្រាយថា (I_n) ជាស្វ៊ីតចុះ រួចគណនា $I_n + I_{n+1} + I_{n+2}$ ។

ខ/គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n)$ ។

IV-គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): y'' + y = (4x^2 + 8x + 2)e^{2x} \quad \text{និង} \quad (F): y'' + y = 0$$

ក/កំណត់ចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យ $y_1 = (ax^2 + bx + c)e^{2x}$

ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ (E) ។

ខ/ស្រាយថា $y = y_1 + y_2$ ជាចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E)

លុះត្រាតែ y_2 ជាចម្លើយរបស់សមីការ (F) ។

គ/ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយរបស់ (E) ។

ដំណោះស្រាយ

I-គណនាលីមីត ៖

$$\text{តាង } L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2} \tan \frac{\pi x}{2x+1}$$

$$\text{គេមាន } \frac{\pi x}{2x+1} = a + \frac{b}{2x+1} = \frac{2ax + a + b}{2x+1}$$

$$\text{គេទាញ } \begin{cases} 2a = \pi \\ a + b = 0 \end{cases} \text{ នាំឲ្យ } a = \frac{\pi}{2} ; b = -\frac{\pi}{2}$$

គណិតវិទ្យាធាតុបឋម

គេបាន $\frac{\pi x}{2x+1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2(2x+1)}$ នៅ: $\tan \frac{\pi x}{2x+1} = \cot \frac{\pi}{2(2x+1)}$

$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2} \cot \frac{\pi}{2(2x+1)}$ តាង $u = \frac{1}{2x+1}$ នៅ: $x = \frac{1-u}{2u}$ ។

កាលណា $x \rightarrow \infty$ នៅ: $u \rightarrow 0$ ។

គេបាន $L = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{4u^2}{(1-u)^2 u} \cot \frac{\pi u}{2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{4u \cos \frac{\pi u}{2}}{(1-u)^2 \sin \frac{\pi u}{2}}$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{4 \cos \frac{\pi u}{2}}{(1-u)^2} \times \frac{\frac{\pi u}{2}}{\sin \frac{\pi u}{2}} \times \frac{2}{\pi} = \frac{8}{\pi}$$

ដូចនេះ: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2} \tan \frac{\pi x}{2x+1} = \frac{8}{\pi}$ ។

II-ក/ ស្រាយថា $f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - \frac{1}{\cos x} \right)$ គ្រប់ $0 < x < \frac{\pi}{6}$

គេមាន $f(x) = \frac{\sin^2 x}{\cos 3x}$ ដែល $0 < x < \frac{\pi}{6}$

គេបាន $f(x) = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos 3x} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - (4\cos^2 x - 3)}{\cos 3x}$

ដោយ $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x = \cos x(4\cos^2 x - 3)$

គេបាន $f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - \frac{4\cos^2 x - 3}{\cos 3x} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - \frac{1}{\cos x} \right)$

ដូចនេះ $f(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - \frac{1}{\cos x} \right)$ គ្រប់ $0 < x < \frac{\pi}{6}$ ។

ខ/គណនា $S_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{x}{3^k}\right)$ និង $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

គេបាន $S_n = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{\cos \frac{x}{3^{k-1}}} - \frac{1}{\cos \frac{x}{3^k}} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - \frac{1}{\cos \frac{x}{3^n}} \right)$

ហើយ $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\cos 3x} - 1 \right) = \frac{\sin^2 \frac{3x}{2}}{2 \cos 3x}$ ។

III-ក/ស្រាយថា (I_n) ជាស្វ៊ីតចុះ:

គេមាន $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + x + 1} \cdot dx$ និង $I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{x^2 + x + 1} \cdot dx$

ចំពោះគ្រប់ $x \in [0, 1]$ និង $n \in \mathbb{N}$ គេមាន $x^n \geq x^{n+1}$

នាំឲ្យ $\frac{x^n}{x^2 + x + 1} \geq \frac{x^{n+1}}{x^2 + x + 1}$ នោះ $I_n \geq I_{n+1}$ ។

ដូចនេះ (I_n) ជាស្វ៊ីតចុះ ។

គណនា $I_n + I_{n+1} + I_{n+2} \div$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } I_n + I_{n+1} + I_{n+2} &= \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1} + x^{n+2}}{x^2 + x + 1} \cdot dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^n(1 + x + x^2)}{x^2 + x + 1} \cdot dx \\ &= \int_0^1 x^n \cdot dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $I_n + I_{n+1} + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$ ។

ខ/គណនាលីមីត $\lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n) \div$

$$\text{គេមាន } I_n + I_{n+1} + I_{n+2} = \frac{1}{n+1} \quad (1)$$

$$\text{គេបាន } I_{n-2} + I_{n-1} + I_n = \frac{1}{n-1} \quad (2) \quad \text{គ្រប់ } n \geq 2 \quad \text{។}$$

ដោយ (I_n) ជាស្វ៊ីតចុះនោះចំពោះគ្រប់ $n \geq 2$ គេមាន

$$I_{n+2} \leq I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1} \leq I_{n-2}$$

$$\text{នាំឲ្យ } I_n + I_{n+1} + I_{n+2} \leq 3I_n \leq I_{n-2} + I_{n-1} + I_n \quad (3)$$

តាម (1) , (2) និង (3) គេទាញបាន ៖

$$\frac{1}{n+1} \leq 3I_n \leq \frac{1}{n-1} \quad \text{នាំឲ្យ} \quad \frac{n}{3(n+1)} \leq nI_n \leq \frac{n}{3(n-1)}$$

$$\text{ដោយ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3(n-1)} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ } \lim_{n \rightarrow \infty} (nI_n) = \frac{1}{3} \quad \text{។}$$

IV-គេឲ្យសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

$$(E): y'' + y = (4x^2 + 8x + 2)e^{2x} \quad \text{និង} \quad (F): y'' + y = 0$$

ក/កំណត់ចំនួនពិត a, b និង c ដើម្បីឲ្យ $y_1 = (ax^2 + bx + c)e^{2x}$

ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការ (E) ។

ខ/ស្រាយថា $y = y_1 + y_2$ ជាចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E)

លុះត្រាតែ y_2 ជាចម្លើយរបស់សមីការ (F) ។

គ/ដោះស្រាយសមីការ (F) រួចទាញរកចម្លើយរបស់ (E) ។

វិញ្ញាសាទី០៩

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេឱ្យស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (u_n) និង (v_n) កំណត់ដោយ៖

$$\begin{cases} u_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ v_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{និង} \quad \begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n - v_n}{\sqrt{2}} \\ v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \text{ដែល } n \geq 1$$

ក. គេពិនិត្យស្វ៊ីតនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_n = u_n + i.v_n$ ។

ចូរស្រាយថា (z_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច រួចគណនា z_n ជាអនុគមន៍នៃ n ដោយសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ខ. សំដែង u_n និង v_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

II-គណនាផលបូក $S = \sum_{i=0}^{101} \frac{x_i^3}{1 - 3x_i + 3x_i^2}$

ដែល $x_i = \frac{i}{101}$; $i = 1, 2, 3, \dots$ ។

III-គេឲ្យ $a \geq 1$ និង $b \geq 1$ ។

ចូរបង្ហាញថា
$$\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b} \leq 2\sqrt{\log_2 \left(\frac{a+b}{2} \right)}$$

IV-គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 3x + 1}{3x^2 - 3x + 1}$ កំនត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន a និង b ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ៖

$$f\left(\frac{1+a+b}{2}\right) \geq f\left(\frac{1+a+b+ab}{2+a+b}\right) \text{ ។}$$

V-គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍ជាប់ និង មានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$ ដែលចំពោះគ្រប់

$$x, y \in \mathbb{R} \text{ គេមានទំនាក់ទំនង } f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{f(x)f(y)} \text{ និង } f(x) > 0 \text{ ។}$$

ចូរកំណត់អនុគមន៍ $y = f(x)$.

ដំណោះស្រាយ

I-ក. ស្រាយថា (z_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច៖

$$\text{គេមាន } z_n = u_n + i.v_n$$

$$\text{គេបាន } z_{n+1} = u_{n+1} + i.v_{n+1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{u_n - v_n}{\sqrt{2}} + i \cdot \frac{u_n + v_n}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2} (u_n + iv_n) = \frac{\sqrt{2} + i\sqrt{2}}{1} z_n
 \end{aligned}$$

ដូចនេះ (z_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច ។

គណនា z_n ជាអនុគមន៍នៃ n ៖

គេបាន $z_n = z_1 \times q^{n-1}$

តែ $z_1 = u_1 + iv_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$

និង $q = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}$

គេបាន $z_n = \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^n$

ដូចនេះ $z_n = \cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4}$ (រូបមន្តឌីម៉ូ)

ខ. សំដែង u_n និង v_n ជាអនុគមន៍នៃ n

គេមាន $z_n = u_n + i \cdot v_n$

$$\text{ដោយ } z_n = \cos \frac{n\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{n\pi}{4}$$

$$\text{ដូចនេះ } u_n = \cos \frac{n\pi}{4} \text{ និង } v_n = \sin \frac{n\pi}{4} \quad \text{។}$$

$$\text{II-គណនាផលបូក } S = \sum_{i=0}^{101} \frac{x_i^3}{1 - 3x_i + 3x_i^2}$$

$$\text{យើងមាន } 1 - 3x + 3x^2 = x^3 + (1 - x)^3 = x^3 - (x - 1)^3$$

$$\text{តាង } f(x) = \frac{x^3}{1 - 3x + 3x^2} = \frac{x^3}{x^3 + (1 - x)^3}$$

$$\text{គេបាន } f(x_i) = \frac{x_i^3}{x_i^3 + (1 - x_i)^3}$$

$$\text{ហើយ } f(1 - x_i) = \frac{(1 - x_i)^3}{(1 - x_i)^3 + x_i^3}$$

$$\text{គេបាន } f(x_i) + f(1 - x_i) = \frac{x_i^3}{x_i^3 + (1 - x_i)^3} + \frac{(1 - x_i)^3}{(1 - x_i)^3 + x_i^3} = 1$$

$$\text{គេទាញ } f(x_i) = 1 - f(1 - x_i)$$

$$\text{ដោយ } x_i = \frac{i}{101} \text{ នោះ } 1 - x_i = 1 - \frac{i}{101} = \frac{101 - i}{101}$$

$$\text{គេបាន } S = \sum_{i=0}^{101} f(x_i) = \sum_{i=0}^{101} f\left(\frac{i}{101}\right) = \sum_{i=0}^{101} \left[1 - f\left(\frac{101-i}{101}\right)\right]$$

$$S = 102 - \sum_{i=0}^{101} f\left(\frac{101-i}{101}\right) = 102 - S$$

$$\text{គេទាញ } S = \frac{102}{2} = 51 \quad \left(\text{ព្រោះ: } \sum_{i=0}^{101} f\left(\frac{i}{101}\right) = \sum_{i=0}^{101} f\left(\frac{101-i}{101}\right) \right)$$

$$\text{III-បង្ហាញថា } \sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b} \leq 2\sqrt{\log_2\left(\frac{a+b}{2}\right)}$$

$$\text{យើងមាន } a + b \geq 2\sqrt{a \cdot b} \quad (\text{វិសមភាព AM - GM})$$

$$\text{ឬ } \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a \cdot b}$$

$$\text{នាំឲ្យ } \log_2\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{2} (\log_2 a + \log_2 b)$$

$$\text{ឬ } \log_2 a + \log_2 b \leq 2 \log_2\left(\frac{a+b}{2}\right) \quad (1)$$

ម្យ៉ាងទៀតគេមាន ៖

$$\log_2 a + \log_2 b \geq 2\sqrt{\log_2 a} \cdot \sqrt{\log_2 b}$$

$$2(\log_2 a + \log_2 b) \geq \log_2 a + 2\sqrt{\log_2 a} \cdot \sqrt{\log_2 b} + \log_2 b$$

$$2(\log_2 a + \log_2 b) \geq (\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b})^2$$

$$\log_2 a + \log_2 b \geq \frac{1}{2} (\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b})^2 \quad (2)$$

តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) យើងទាញ៖

$$\frac{1}{2} (\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b})^2 \leq 2 \log_2 \left(\frac{a+b}{2} \right)$$

$$(\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b})^2 \leq 4 \log_2 \left(\frac{a+b}{2} \right)$$

$$\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b} \leq 2 \sqrt{\log_2 \left(\frac{a+b}{2} \right)}$$

ដូចនេះ: $\sqrt{\log_2 a} + \sqrt{\log_2 b} \leq 2 \sqrt{\log_2 \left(\frac{a+b}{2} \right)}$ ។

IV-ស្រាយបញ្ជាក់ថា $f\left(\frac{1+a+b}{2}\right) \geq f\left(\frac{1+a+b+ab}{2+a+b}\right)$

យើងមាន $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 3x + 1}{3x^2 - 3x + 1}$ កំនត់ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2 + 6x - 3)(3x^2 - 3x + 1) - (6x - 3)(x^3 + 3x^2 - 3x + 1)}{(3x^2 - 3x + 1)^2} \\ &= \frac{3x^4 - 6x^3 + 3x^2}{(3x^2 - 3x + 1)^2} = \frac{3x^2(x-1)^2}{(3x^2 - 3x + 1)^2} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើនលើ $\mathbb{R}$ ។

ម្យ៉ាងទៀតយើងសន្មតថា $\frac{1+a+b}{2} \geq \frac{1+a+b+ab}{2+a+b}$

គេបាន $\frac{2}{1+a+b} \leq \frac{2+a+b}{1+a+b+ab}$

$$\frac{2}{1+a+b} \leq \frac{(1+a)+(1+b)}{(1+a)(1+b)}$$

$$\frac{2}{1+a+b} \leq \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b}$$

ដោយ $\frac{1}{1+a+b} \leq \frac{1}{1+a}$ និង $\frac{1}{1+a+b} \leq \frac{1}{1+b}$

គ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន a និង b ។

គេទាញ $\frac{2}{1+a+b} \leq \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b}$

នាំឲ្យការសន្មត $\frac{1+a+b}{2} \geq \frac{1+a+b+ab}{2+a+b}$ ពិត។

ដូចនេះតាមលក្ខណៈអនុគមន៍កើនគេទាញបាន ៖

$$f\left(\frac{1+a+b}{2}\right) \geq f\left(\frac{1+a+b+ab}{2+a+b}\right) \text{ ។}$$

V-កំណត់អនុគមន៍ $y = f(x)$

គេមានទំនាក់ទំនង $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{f(x)f(y)}$

ដោយ $f(x) > 0$ នោះ $f(y) > 0$ និង $f\left(\frac{x+y}{2}\right) > 0$

តាងអនុគមន៍ $g(x) = \ln f(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

គេបាន $g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \ln\left[f\left(\frac{x+y}{2}\right)\right]$ ដោយ $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{f(x)f(y)}$

ហេតុនេះ $g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \ln\left[\sqrt{f(x)f(y)}\right] = \frac{1}{2}[\ln f(x) + \ln f(y)]$

ឬ $g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[g(x) + g(y)]$

ធ្វើដេរីវេធៀបនឹង x ក្នុងសមភាព $g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[g(x) + g(y)]$

ដោយចាត់ទុក y ជាអថេរមិនអាស្រ័យនឹង x គេបាន ៖

$\frac{1}{2}g'\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}g'(x)$ ឬ $g'\left(\frac{x+y}{2}\right) = g'(x)$

យក $x = 0$ គេបាន $g'\left(\frac{y}{2}\right) = g'(0)$

ធ្វើអាំងតេក្រាល $\int g'(\frac{y}{2})dy = \int g'(o)dy = g'(0)y + k$

តាង $z = \frac{y}{2}$ នោះ $dy = 2dz$

គេបាន $2\int g'(z)dz = g'(0)y + k$

$$2g(z) = g'(0)y + k \quad \text{ឬ} \quad g(z) = \frac{1}{2}g'(0)y + \frac{k}{2} = g'(0)z + \frac{k}{2}$$

យក $a = g'(0)$ និង $b = \frac{k}{2}$ គេបាន $g(z) = az + b$

ឬ $g(x) = ax + b$ ដោយ $g(x) = \ln f(x)$

គេបាន $\ln f(x) = ax + b$ នាំឱ្យ $f(x) = e^{ax+b}$

ដូចនេះ $f(x) = e^{ax+b}$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ ។

វិញ្ញាសាទី១០

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-គេកំណត់ចំនួន $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ ដូចខាងក្រោម៖

$$a_0 = \frac{1}{2}; a_{k+1} = a_k + \frac{a_k^2}{n} \quad (n > 1, k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$

ចូរបង្ហាញថា $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$ ។

II-គណនាផលគុណខាងក្រោម៖

$$P_n = \prod_{k=0}^n \left(\tan^{2^k} \frac{x}{2^k} \right) = \tan x \cdot \tan^2 \frac{x}{2} \cdot \tan^4 \frac{x}{4} \dots \tan^{2^n} \frac{x}{2^n}$$

III-ដោះស្រាយសមីការ

$$\log_3(2^x + 1) + \frac{6}{\log_3(2^x + 1)} = 1 + 2\sqrt{\log_3(2^x + 1) + \frac{8}{\log_3^2(2^x + 1)}}$$

IV-គេឱ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់លើចន្លោះ $[0,1]$ ដោយដឹងថា៖

$$f(0) = f(1) = 1 \quad \text{និង} \quad |f(a) - f(b)| < |a - b| \quad \text{ចំពោះគ្រប់} \quad a \neq b$$

ក្នុងចន្លោះ $[0,1]$ ។

ដំណោះស្រាយ

I-បង្ហាញថា $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$

$$\text{គេមាន } a_{k+1} = a_k + \frac{a_k^2}{n} = \frac{a_k(n + a_k)}{n}$$

$$\text{គេបាន } \frac{1}{a_{k+1}} = \frac{n}{a_k(a_k + n)} = \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_k + n}$$

$$\text{ឬ } \frac{1}{a_k + n} = \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}}$$

$$\text{ហេតុនេះ: } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{a_k + n} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_n} = 2 - \frac{1}{a_n} \quad (*)$$

គេមាន $a_0 = \frac{1}{2} > 0$ ពិត ។ ឧបមាថា $a_k > 0$ ពិត

តាម $a_{k+1} = a_k + \frac{a_k^2}{n}$ គេទាញបាន $a_{k+1} > 0$ ពិត

ដូចនេះ: $a_k > 0$ នោះ: $a_k + n > n$ ឬ $\frac{1}{a_k + n} < \frac{1}{n}, \forall n > 1$

$$\text{គេបាន } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{a_k + n} < \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} = \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_{(n)} = \frac{n}{n} = 1$$

$$\text{តាម (*) គេទាញបាន } 2 - \frac{1}{a_n} < 1 \text{ នាំឱ្យ } a_n < 1 \text{ (i)}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀតដោយ } a_n < 1 \text{ នោះ } a_k < 1 \text{ ឬ } a_k + n < n + 1$$

$$\text{ឬ } \frac{1}{a_k + n} > \frac{1}{n + 1} \text{ គ្រប់ } k = 0, 1, 2, \dots, n - 1 \text{ ។}$$

$$\text{គេបាន } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{a_k + n} > \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n + 1} = \frac{n}{n + 1}$$

$$\text{ដោយពិនិត្យឃើញថាគ្រប់ } n > 1 \text{ គេមាន } \frac{n}{n + 1} - \frac{n - 2}{n - 1} = \frac{2}{n^2 - 1} > 0$$

$$\text{នោះគេទាញបាន } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{a_k + n} > \frac{n}{n + 1} > \frac{n - 2}{n - 1}$$

$$\text{តាម (*) គេទាញបាន } 2 - \frac{1}{a_n} > \frac{n - 2}{n - 1}$$

$$\text{ឬ } \frac{1}{a_n} < 2 - \frac{n - 2}{n - 1} = \frac{n}{n - 1} \text{ នោះ } a_n > \frac{n - 1}{n} = 1 - \frac{1}{n} \text{ (ii)}$$

តាម (i) & (ii) គេទាញបាន $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$ ។

ដូចនេះ $1 - \frac{1}{n} < a_n < 1$ ។

II-គណនាផលគុណ $P_n = \prod_{k=0}^n \left(\tan^{2^k} \frac{x}{2^k} \right)$

គេមាន $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{2 \sin^2 a}{2 \sin a \cos a} = \frac{2 \sin^2 a}{\sin 2a}$

យក $a = \frac{x}{2^k}$ គេបាន $\tan \frac{x}{2^k} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2^k}}{\sin \frac{2x}{2^k}}$

គេទាញ $P_n = \prod_{k=0}^n \left(2^{2^k} \cdot \frac{\sin^{2^{k+1}} \frac{x}{2^k}}{\sin^{2^k} \frac{2x}{2^k}} \right) = 2^{2^{n+1}-1} \cdot \frac{\sin^{2^{n+1}} \frac{x}{2^n}}{\sin 2x}$

ដូចនេះ $P_n = 2^{(2^{n+1}-1)} \cdot \frac{\sin^{2^{n+1}} \frac{x}{2^n}}{\sin 2x}$ ។

III-ដោះស្រាយសមីការ

$$\log_3(2^x + 1) + \frac{6}{\log_3(2^x + 1)} = 1 + 2\sqrt{\log_3(2^x + 1) + \frac{8}{\log_3^2(2^x + 1)}}$$

តាង $t = \log_3(2^x + 1)$ សមីការអាចសរសេរ ៖

$$t + \frac{6}{t} = 1 + 2\sqrt{t + \frac{8}{t^2}} \quad \text{ឬ} \quad \frac{t^2 - t + 6}{t} = 2\sqrt{\frac{(t+2)(t^2 - 2t + 4)}{t^2}}$$

$$\text{ឬ} \quad \frac{t^2 - t + 6}{t} = 2\sqrt{\frac{t+2}{t} \cdot \frac{t^2 - 2t + 4}{t}} \quad (1)$$

តាង $u = \frac{t+2}{t}$ និង $v = \frac{t^2 - 2t + 4}{t}$ គេបាន $u + v = \frac{t^2 - t + 6}{t}$

សមីការ អាចសរសេរ (1) $u + v = 2\sqrt{uv} \Leftrightarrow (\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 = 0$

គេទាញ $u = v$ ឬ $\frac{t+2}{t} = \frac{t^2 - 2t + 4}{t} \quad (t \neq 0)$

$$\text{ឬ} \quad t + 2 = t^2 - 2t + 4$$

$$\text{ឬ} \quad t^2 - 3t + 2 = 0 \quad \text{មានឫស } t_1 = 1; t_2 = 2 \quad \text{។}$$

ចំពោះ $-t = 1 \Rightarrow \log_3(2^x + 1) = 1$

$$\Rightarrow 2^x + 1 = 3$$

$$\Rightarrow 2^x = 2$$

$$\Rightarrow x = 1$$

ចំពោះ $-t = 2 \Rightarrow \log_3(2^x + 1) = 2$

$$\Rightarrow 2^x + 1 = 9$$

$$\Rightarrow 2^x = 8$$

$$\Rightarrow x = 3$$

ដូចនេះសមីការមានឫស $x_1 = 1, x_2 = 3$ ។

បង្ហាញថា $|f(a) - f(b)| < \frac{1}{2}$

-ករណីទី១៖

ចំពោះ $|a - b| \leq \frac{1}{2}$ នោះគេបាន $|f(a) - f(b)| < |a - b| \leq \frac{1}{2}$ ពិត

-ករណីទី២ ៖

ចំពោះ $|a - b| > \frac{1}{2}$ នោះតាមលក្ខណៈឆ្លុះគេអាចសន្មតថា $a > b$

$$\text{គេមាន } |f(a) - f(b)| = |f(a) - f(1) + f(0) - f(b)|$$

តាមវិសមភាពត្រីកោណគេបាន៖

$$|f(a) - f(b)| \leq |f(a) - f(1)| + |f(0) - f(b)|$$

$$|f(a) - f(b)| < |a - 1| + |0 - b| = 1 - a + b = 1 - (a - b) < \frac{1}{2}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } |f(a) - f(b)| < \frac{1}{2} \quad \text{។}$$

វិញ្ញាសាទី១១

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ៖

$$\begin{cases} xy + x + y = 11 \\ x^2y^2 + x^2 + y^2 = 49 \end{cases} \quad \text{ដែល } x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \quad ។$$

II-ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត $(a_n)_{n \geq 1}$ កំណត់ដោយ $a_1 = 1$, $a_2 = 3$

$$\text{និង } a_{n+2} = (n+3)a_{n+1} - (n+2)a_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

ចូរកំណត់គ្រប់តម្លៃ n ដើម្បីឱ្យ a_n ចែកជាចំនួន 11 ។

III-ក. ចូរគណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin \frac{\pi}{10}$ និង $\cos \frac{\pi}{10}$

$$\text{ខ. ចូរស្រាយថា } x^2 + (x-y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$$

គ្រប់ចំនួន $x, y \in \mathbb{R}$ ។

IV-គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \ln(1 + 2e^x)$ ដែល x ជាចំនួនពិត ។

គេពិនិត្យស្វ៊ីតពីរ (a_n) និង (b_n) កំណត់ ដោយទំនាក់ទំនង

$$a_0 = f(0) , a_{n+1} = f(a_n) \text{ និង } b_n = 1 + e^{a_n} \text{ គ្រប់ } n = 0, 1, 2, \dots$$

ក/ចូរស្រាយថា (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ។

ខ/គណនា b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

V-គេឱ្យ x, y, z ជាចំនួនពិតផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2y^2 + 2yx^2 + 1 = 0$ ។

ចូរកំណត់តម្លៃតូចបំផុត និង ធំបំផុតនៃអនុគមន៍ ៖

$$f(x, y) = \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} + y(y + \frac{1}{x} + 2) \quad \text{។}$$

ដំណោះស្រាយ

I-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ ៖

រៀបទី ១

$$\begin{cases} xy + x + y = 11 & (1) \\ x^2y^2 + x^2 + y^2 = 49 & (2) \end{cases}$$

តាង $s = x + y$ និង $p = xy$

សមីការ (1) ក្លាយជា $p + s = 11$ ឬ $s = 11 - p$ (3)

សមីការ (2) អាចសរសេរ $x^2y^2 + (x + y)^2 - 2xy = 49$

$$\text{ឬ } p^2 + s^2 - 2p = 49 \quad (4)$$

យកសមីការ (3) ជំនួសក្នុង (4) គេបាន ៖

$$p^2 + (11 - p)^2 - 2p = 49$$

$$p^2 + 121 - 22p + p^2 - 2p = 49$$

$$2p^2 - 24p + 72 = 0$$

$$2(p - 6)^2 = 0$$

គណិតវិទ្យាធាតុបឋម

គេទាញយក $p = 6$ ហើយតាម (3) គេបាន $s = 11 - 6 = 5$

គេបាន $s = 5$, $p = 6$ នោះ x និង y ជាឫសសមីការ ៖

$$X^2 - 5X + 6 = 0 \quad \text{នាំឲ្យ } X_1 = 2, X_2 = 3$$

ដូចនេះ $x = 2, y = 3$ ឬ $x = 3, y = 2$ ។

រៀបចំ

$$\begin{cases} xy + x + y = 11 & (1) \\ x^2y^2 + x^2 + y^2 = 49 & (2) \end{cases}$$

គុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការ (1) នឹង 10 គេបាន ៖

$$\begin{cases} 10xy + 10x + 10y = 110 & (1) \\ x^2y^2 + x^2 + y^2 = 49 & (2) \end{cases}$$

ធ្វើផលដកសមីការ (2) នឹង (1) អង្គនឹងអង្គគេបាន ៖

$$x^2y^2 + x^2 + y^2 - 10xy - 10x - 10y = -61$$

$$(x^2y^2 - 12xy + 36) + (x^2 + y^2 + 25 + 2xy - 10x - 10y) = 0$$

$$(xy - 6)^2 + (x + y - 5)^2 = 0$$

$$\text{គេទាញ} \begin{cases} (x+y-5)^2 = 0 \\ (xy-6)^2 = 0 \end{cases} \quad \text{នាំឲ្យ} \begin{cases} x+y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

នោះ x និង y ជាឫសសមីការ $X^2 - 5X + 6 = 0$

$$\text{នាំឲ្យ } X_1 = 2, X_2 = 3 \text{ ។}$$

$$\text{ដូចនេះ } x = 2, y = 3 \text{ ឬ } x = 3, y = 2 \text{ ។}$$

II-កំណត់គ្រប់តម្លៃ n ដើម្បីឱ្យ a_n ចែកជាចំនួន 11

$$\text{គេមាន } a_{n+2} = (n+3)a_{n+1} - (n+2)a_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{ឬ } a_{n+2} - a_{n+1} = (n+2)(a_{n+1} - a_n)$$

$$\text{ឬ } \frac{a_{n+2} - a_{n+1}}{a_{n+1} - a_n} = n+2$$

$$\text{គេបាន } \prod_{k=1}^{(n-2)} \left(\frac{a_{k+2} - a_{k+1}}{a_{k+1} - a_k} \right) = \prod_{k=1}^{(n-2)} (k+2)$$

$$\frac{a_n - a_{n-1}}{a_2 - a_1} = 3.4.5.....n \quad \text{ដោយ } a_2 - a_1 = 2$$

$$\text{គេទាញបាន } a_n - a_{n-1} = n!$$

$$\text{ហើយ } \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}) = \sum_{k=2}^n (k!)$$

$$a_n - a_1 = 2! + 3! + \dots + n! \quad \text{ដោយ } a_1 = 1 = 1!$$

$$\text{គេបាន } a_n = 1! + 2! + 3! + \dots + n! \quad \text{។}$$

-ករណីទី១ ៖ ចំពោះ $n < 11$ គេមាន

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 3$$

$$a_3 = 1! + 2! + 3! = 9$$

$$a_4 = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 = 3 \times 11$$

$$a_5 = a_4 + 5! = 153$$

$$a_6 = a_5 + 6! = 873$$

$$a_7 = a_6 + 7! = 5913$$

$$a_8 = a_7 + 8! = 46233 = 4203 \times 11$$

$$a_9 = a_8 + 9! = 409113$$

$$a_{10} = a_9 + 10! = 4037913$$

$$\text{គេបាន } n=4, n=8 \quad \text{។}$$

-ករណីទី២ ចំពោះ $n \geq 11$

$$\text{គេបាន } a_n = a_{10} + \sum_{k=11}^n (k!)$$

ដោយ $\sum_{k=11}^n (k!)$ ចែកដាច់នឹង 11 ហើយ a_{10} ចែកមិនដាច់នឹង 11

នោះចំពោះ $n \geq 11$ គេបាន a_n ចែកមិនដាច់នឹង 11 ។

ដូចនេះតម្លៃ n ដែលធ្វើឱ្យ a_n ចែកដាច់នឹង 11 មានតែពីរគត់គឺ ៗ

$$n = 4 \quad \text{ឬ} \quad n = 8 \quad \text{។}$$

III-ក. គណនាតម្លៃប្រាកដនៃ $\sin \frac{\pi}{10}$ និង $\cos \frac{\pi}{10}$

$$\text{គេមាន } \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10}$$

$$\text{គេបាន } \sin \frac{2\pi}{10} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10} \right) = \cos \frac{3\pi}{10}$$

តាមរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ ៖

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a \quad \text{និង} \quad \cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a$$

$$2\sin\frac{\pi}{10}\cos\frac{\pi}{10}=\cos\frac{3\pi}{10}$$

$$2\sin\frac{\pi}{10}\cos\frac{\pi}{10}=3\cos\frac{\pi}{10}-4\cos^3\frac{\pi}{10}$$

$$2\sin\frac{\pi}{10}=3-4\cos^2\frac{\pi}{10}$$

$$2\sin\frac{\pi}{10}=3-4(1-\sin^2\frac{\pi}{10})$$

ឬ $4\sin^2\frac{\pi}{10}-2\sin\frac{\pi}{10}-1=0$ តាង $t=\sin\frac{\pi}{10}>0$

គេបាន $4t^2-2t-1=0$, $\Delta'=1+4=5>0$

គេទាញយក $t_1=\frac{1-\sqrt{5}}{4}<0$ (មិនយក) , $t_2=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$

ដូចនេះ $\sin\frac{\pi}{10}=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$ ។

ដោយ $\sin^2\frac{\pi}{10}+\cos^2\frac{\pi}{10}=1$

នាំឲ្យ $\cos\frac{\pi}{10}=\sqrt{1-(\frac{1+\sqrt{5}}{4})^2}=\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$

ដូចនេះ $\cos\frac{\pi}{10}=\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$ ។

ខ. ស្រាយថា $x^2 + (x - y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$

តាងអនុគមន៍ $f(x; y) = x^2 + (x - y)^2 - 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$

គេបាន ៖

$$\begin{aligned} f(x; y) &= x^2 + x^2 - 2xy + y^2 - 4(x^2 + y^2) \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^2 \\ &= 2x^2 - 2xy + y^2 - 4(x^2 + y^2) \frac{6 + 2\sqrt{5}}{16} \\ &= 2x^2 - 2xy + y^2 - (x^2 + y^2) \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \\ &= \frac{1 - \sqrt{5}}{2} x^2 - 2xy - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} y^2 \\ &= - \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} x^2 + 2xy + \frac{\sqrt{5} + 1}{2} y^2 \right) \\ &= - \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{2}} x + \sqrt{\frac{\sqrt{5} + 1}{2}} y \right)^2 \leq 0, \forall x, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

ដូចនេះ $x^2 + (x - y)^2 \leq 4(x^2 + y^2) \sin^2 \frac{\pi}{10}$ ។

IV-ក/ស្រាយថា (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រ ៖

$$\text{គេមាន } a_0 = f(0) = \ln 3 \text{ និង } a_{n+1} = \ln(1 + 2e^{a_n})$$

$$\text{ហើយ } b_n = 1 + e^{a_n} \text{ នោះ } b_{n+1} = 1 + e^{a_{n+1}}$$

$$b_{n+1} = 1 + e^{\ln(1+2e^{a_n})} = 1 + 1 + 2e^{a_n}$$

$$b_{n+1} = 2(1 + e^{a_n}) = 2b_n$$

ទំនាក់ទំនងនេះបញ្ជាក់ថា (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានសេដ្ឋកិច្ច 2 ។

ខ/គណនា b_n និង a_n ជាអនុគមន៍នៃ n

ដោយ (b_n) ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រមានសេដ្ឋកិច្ច $q = 2$ និងតួទីមួយ

$$b_0 = 1 + e^{a_0} = 1 + e^{\ln 3} = 4 \text{ នោះគេបាន ៖}$$

$$b_n = b_0 \times q^n = 4 \times 2^n = 2^{n+2} \text{ ហើយតាម } b_n = 1 + e^{a_n}$$

$$\text{គេទាញ } a_n = \ln(b_n - 1) = \ln(2^{n+2} - 1) \text{ ។}$$

$$\text{ដូចនេះ } b_n = 2^{n+2}, a_n = \ln(2^{n+2} - 1) \text{ ។}$$

V-កំណត់តម្លៃតូចបំផុត និង ធំបំផុត ៖

$$\text{គេមាន } x^2y^2 + 2yx^2 + 1 = 0$$

$$\text{គេបាន } y^2 + 2y + \frac{1}{x^2} = 0 \text{ ឬ } (y+1)^2 + \frac{1}{x^2} = 1 \text{ ដែល } x \neq 0$$

$$\text{តាង } y+1 = \cos \varphi \text{ និង } \frac{1}{x} = \sin \varphi$$

$$\text{នោះ } (y+1)^2 + \frac{1}{x^2} = 1 \text{ ពិតគ្រប់ } \varphi$$

$$\text{គេមាន } f(x,y) = \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} + y(y + \frac{1}{x} + 2)$$

$$= 2\sin^2 \varphi + \sin \varphi + (\cos \varphi - 1)(\cos \varphi - 1 + \sin \varphi + 2)$$

$$= 2\sin^2 \varphi + \sin \varphi + \cos^2 \varphi - 1 + \sin \varphi \cos \varphi - \sin \varphi$$

$$= \sin^2 \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(\frac{\pi}{4} + 2\varphi)$$

$$\text{ដូចនេះ } \min f(x,y) = \frac{1-\sqrt{2}}{2} \text{ និង } \max = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \quad \text{។}$$

វិញ្ញាសាទី១២

សម្រាប់រយៈពេល២ម៉ោង



I-ចូរដោះស្រាយសមីការ $\log_{12}(\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}) = \frac{1}{2} \log_9 x$

II-គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, $x \in \mathbb{R}$

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $f\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < f\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$

ចំពោះគ្រប់ $a > 0, b > 0$ ។

III-គេឱ្យ m និង n ជាចំនួនគត់មិនអវិជ្ជមាន។

ចូរបង្ហាញថា $\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$ ជាចំនួនគត់ ។

IV-គេឱ្យ $a ; b ; c ; d$ និង x ជាចំនួនពិតផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖

$\frac{\sin x}{a} = \frac{\sin 2x}{b} = \frac{\sin 3x}{c} = \frac{\sin 4x}{d}$ ដែល $x \neq k\pi ; k \in \mathbb{Z}$

ចូរបង្ហាញថា $a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$

ដំណោះស្រាយ

I-ចូរដោះស្រាយសមីការ ៖

$$\log_{12}(\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}) = \frac{1}{2} \log_9 x \quad (1)$$

សមីការមានន័យលុះត្រាតែ $\begin{cases} x > 0 \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt{x} > 0 \end{cases}$ នាំឱ្យ $x > 0$

តាង $t = \frac{1}{2} \log_9 x$ នោះ $x = 9^{2t}$ (2)

តាម (1) គេបាន $\log_{12}(\sqrt[4]{x} + \sqrt{x}) = t$

នាំឱ្យ $\sqrt[4]{x} + \sqrt{x} = 12^t$ (3)

យកសមីការ (2) ជំនួសក្នុង (3) គេបាន $3^t + 9^t = 12^t$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 12^t គេបាន $\left(\frac{1}{4}\right)^t + \left(\frac{3}{4}\right)^t = 1$ (4)

-ចំពោះ $t = 1$ យកជំនួសក្នុងសមីការ (4) គេបាន $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

នោះ $t = 1$ ជាឫសនៃសមីការ (4) ។

-ចំពោះ $t > 1$ គេបាន $(\frac{1}{4})^t + (\frac{3}{4})^t < \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

នោះ (4) គ្មានឫសចំពោះ $t > 1$ ។

-ចំពោះ $t < 1$ គេបាន $(\frac{1}{4})^t + (\frac{3}{4})^t > \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

នោះ (4) គ្មានឫសចំពោះ $t < 1$ ។

សរុបមកសមីការ (4) មានឫសតែមួយគត់គឺ $t = 1$ ។

ចំពោះ $t = 1$ តាម (2) គេបាន $x = 9^2 = 81$ ។

យក $x = 81$ ទៅជំនួសក្នុងសមីការ (1) គេបាន ៖

$$\log_{12}(\sqrt[4]{81} + \sqrt{81}) = \frac{1}{2} \log_9 81$$

$$\log_{12} 12 = \log_9 9 \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះសមីការមានឫស $x = 81$ ។

II-ស្រាយបញ្ជាក់ថា $f\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < f\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$

យើងមាន $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\text{យើងបាន } f'(x) &= \frac{(x + \sqrt{1+x^2})'}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{(x + \sqrt{1+x^2})(\sqrt{1+x^2})} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\end{aligned}$$

$$\text{ដោយ } f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះអនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$ ។

ម្យ៉ាងទៀតចំពោះគ្រប់ $a > 0, b > 0$ គេមាន ៖

$$\frac{a}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} \quad \text{និង} \quad \frac{b}{1+a+b} < \frac{b}{1+b}$$

$$\text{គេទាញ } \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

$$\text{ឬ } \frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

ដោយសារតែអនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ចលើ $\mathbb{R}$

ហេតុនេះតាមលក្ខណៈអនុគមន៍កើនគេបាន ៖

$$\frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \quad \text{នោះ } f\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < f\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$$

$$\text{ដូចនេះ } f\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < f\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$$

ចំពោះគ្រប់ $a > 0, b > 0$ ។

$$\text{III-តាង } f(m,n) = \frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$$

-ចំពោះ $n = 0$ គេបាន $f(m,0) = \frac{(2m)!}{(m!)^2} = C_{2m}^m$ ជាចំនួនគត់គ្រប់

ចំនួនគត់មិនអវិជ្ជមាន m ។

$$\begin{aligned} \text{-យើងមាន } f(m+1,n) &= \frac{(2m+2)!(2n)!}{(m+1)!n!(m+n+1)!} \\ &= \frac{(2m)!(2n)!(2m+1)(2m+2)}{(m!)(m+1).n!(m+n)!(m+n+1)} \\ &= \frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!} \cdot \frac{4m+2}{m+n+1} \\ &= \frac{4m+2}{m+n+1} f(m,n) \end{aligned}$$

$$\text{ស្រាយដូចគ្នា } f(m,n+1) = \frac{4n+2}{m+n+1} f(m,n)$$

គេបាន $f(m+1, n) + f(m, n+1) = 4f(m, n)$

គេទាញ $f(m, n+1) = 4f(m, n) - f(m+1, n) \quad (*)$,

យើងនឹងស្រាយតាមកំណើនតាម n ថា $f(m, n)$ ជាចំនួនគត់ ។

ចំពោះ $n = 0$ គេបាន $f(m, 0) = C_{2m}^m$ ជាចំនួនគត់

ចំពោះគ្រប់ $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ (សម្រាយខាងលើ) ។

ឧបមាថា $f(m, n)$ ជាចំនួនគត់គ្រប់ $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

យើងនឹងស្រាយថា $f(m+1, n)$ ជាចំនួនគត់ដែរ ។

តាម $(*)$ គេទាញបាន $f(m, n+1)$ ជាចំនួនគត់ដែរព្រោះ $f(m, n)$

និង $f(m+1, n)$ ជាចំនួនគត់ ។

ដូចនេះ $\frac{(2m)! (2n)!}{m! n! (m+n)!}$ ជាចំនួនគត់ ។

IV-បង្ហាញថា $a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$

តាង $\frac{\sin x}{a} = \frac{\sin 2x}{b} = \frac{\sin 3x}{c} = \frac{\sin 4x}{d} = t$

គេទាញ $\left\{ \begin{array}{l} \sin x = at \\ \sin 2x = bt \\ \sin 3x = ct \\ \sin 4x = dt \end{array} \right.$

គេមាន $\sin 4x = 2\sin 2x \cos 2x$

$$\sin^2 4x = 4\sin^2 2x \cos^2 2x$$

$$\sin^2 4x = 4\sin^2 2x(1 - \sin^2 2x)$$

$$d^2 t^2 = 4b^2 t^2 (1 - b^2 t^2)$$

គេទាញ $t^2 = \frac{1}{b^2} \left(1 - \frac{d^2}{4b^2} \right) \quad (1)$

ម្យ៉ាងទៀត $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

$$\sin 3x = \sin x(3 - 4\sin^2 x)$$

$$ct = at(3 - 4a^2 t^2)$$

គេទាញ $t^2 = \frac{1}{4a^2} \left(3 - \frac{c}{a}\right)$ (2)

ផ្អែម (1) និង (2) គេបាន ៖

$$\frac{1}{b^2} \left(1 - \frac{d^2}{4b^2}\right) = \frac{1}{4a^2} \left(3 - \frac{c}{a}\right)$$

$$\frac{4b^2 - d^2}{4b^4} = \frac{3a - c}{4a^3}$$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង a^3b^4 គេបាន $a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$

ដូចនេះ $a^3(4b^2 - d^2) = b^4(3a - c)$ ។

